

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷五

雜病源流犀燭

腫脹源流 痞滿

沈金鰲撰

腫脹脾、肺、腎三經病也。攷內經五臟六腑五運六氣司天在泉勝復淫鬱無不成腫脹之病。而張介賓以爲未有不干於脾、肺、腎三臟者。其意以脾主運化精微，肺主氣行治節，腎主五液而行水。凡五氣所化之液，悉屬於腎。五液所行之氣，悉屬於肺。輸轉二臟利水生金，悉屬於脾。所以腫脹之生，無不由三者失職。旨哉洞本之論也。然又必先腎氣不足，下氣厥上，三合而成。經曰：厥氣在下，營衛留止，寒氣逆上，真邪相攻，兩氣相搏，乃合爲脹。又曰：五臟陽已竭，又曰：合之于真，三合乃得。夫厥氣在下，此病根也。人身上下，陽布陰生，則肺行而腎納於何有厥。厥氣在下，則肺不行而腎失納。

矣。至氣已厥，必營衛之流行經絡者留止，無根之陰氣於是逆上，與真氣相搏，寒留而不行，乃合爲脹也。況臟陽卽元運之氣，臟陽竭，諸停而不行，可知。其曰合之於真三合，乃得者，人之脹雖由衛逆於營，而旣在血脉，則合經絡合臟合腑，陰陽俱有，故曰三合乃得。特厥氣在下，究爲脹之本耳。故經又以診之，而其脉大堅以濇者爲脹，蓋大者邪氣盛也，堅者邪氣寔也，兩氣相攻，脹勢已成，故其脉大堅以厥於陽而寔也。濇者氣血虛而不流利也，是爲陰氣衰，陰氣衰卽真氣衰，此厥於陰而虛也。陰虛陽堅，中氣已損，能勿脹乎？是以濇而堅者，其病在陰，卽脹在臟，經故曰陰爲臟大而堅者，其病在陽，則脹在腑，經故曰陽爲腑。於是有脉脹有膚脹，有五臟脹，有六腑脹，而又有水脹有鼓脹有蠱脹有單腹脹有石水種種之症，而其爲症又虛寔不倫，虛中有寔，寔中有虛，行寔當顧虛。

補虛無忘寔。而其要惟大補脾腎以培根本則得之矣。至于辨驗虛寔莫善于土材。其說云。陽症必熱。熱者多寔。陰症必寒。寒者多虛。先脹于內而後腫於外者爲寔。先腫于外而後脹于內者爲虛。小便黃赤。大便秘結者爲寔。小便清白。大便溏泄者爲虛。脈浮弦細澀者爲虛。色紅氣粗者爲寔。色瘁聲短者爲虛。凡寔或六淫外客。或飲食內傷。陽邪急速。其至必暴。每成于數日之間。凡虛或情志多勞。或酒色過度。日積月累。其來有漸。每成于經月之後。故治寔易。治虛難。土材之言當奉以爲則。而于虛寔疑似之間。復能察脈審形。辨別毫釐。庶無寔寔虛虛之害。試先卽脹病條分之。經曰。五臟六腑各有畔界。病各有形狀。營氣循脈。衛氣逆之。爲脈脹。蓋清者爲營。營行脈中。其氣專精。未卽致脹。濁者爲衛。衛行脈外。其氣慄疾滑利而行內分。此必由衛氣之逆而

後病及營而爲脈脹也是知凡病脹皆發於衛經又曰衛氣並脈循分爲膚脹蓋衛氣逆而並於脈復循肉分之間故爲膚脹然脹無常所既脹皮膚即排臟腑而廓胸脇凡膻中心主之宮城脾之大倉咽喉小腸之傳送胃之五竅閭里門戶廉泉玉英之津道應無不受脹者又曰心脹者短氣煩心卧不安肺脹者虛滿而喘咳肝脹者脇下滿而痛引少腹脾脹者善噦四肢煩冤體重不能勝衣卧不安腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛胃脹者腹滿胃腕痛鼻聞焦臭妨于食大便難大腸脹者腸鳴濯濯而痛冬日重感于寒則殭泄不化小腸脹者少腹填脹引腰而痛膀胱脹者少腹滿而氣癢三焦脹者氣滿于皮膚中輕輕然而不堅胆脹者脇下痛脹口中苦善太息以上經言臟腑之脹總以治脹藥爲主宜藿香木香調氣散蘇子湯等各加引經之劑療之心黃連細辛肺桔梗升麻白芷肝柴胡川芎青皮吳萸脾升麻

蒼木葛根白芍腎獨活知母細辛肉桂胃白芷升麻葛根石膏大
腸白芷升麻黃芩石膏小腸黃柏棗本赤苓木通膀胱滑石羌活
三焦柴胡連翹下焦地方為正治經又曰膚脹者寒氣客於皮膚
骨定胆柴胡青皮連翹方為正治經又曰膚脹者寒氣客於皮膚
之間。蹇蹇然不堅。腹大身盡腫。皮厚。按其腹。皆而不起。腹色不變。
此其候也。蓋以寒客皮膚間。陽氣不行。病在氣分。故有聲若鼓。氣
無形。故不堅。氣無不至。故腹大身盡腫。凡腫因水。則皮澤而薄。因
氣。故皮厚。氣在膚腠。故按散之。猝不起。腹皮厚。故色不變。此膚脹
乃氣病也。宜加味前文言膚脹。以脹必見於膚。乃總言致脹之由。
此則專為一症也。經又曰。鼓脹者。腹脹。身皆大。大與膚脹等。色蒼
黃。腹筋起。此其候也。此鼓脹亦氣分病。故與膚脹相似。惟腹有筋
起為異。但膚脹病根在肺。鼓脹病根在脾。由脾陰受傷。胃雖納穀。
脾不運化。或由怒氣傷肝。漸蝕其脾。脾虛之極。故陰陽不交。清濁
相混。隧道不通。鬱而為熱。熱留為濕。濕熱相生。故其腹脹大中空。

無物。外皮。綱急。且食不能暮食也。但臍突出。肚見青筋。皮光如油。皆不治。脉亦喜浮大。忌虛小。蓋鼓有土敗木賊之象。濕熱相兼。猶饅頭得火與湯。乃發。胖治者。先令却鹽味。厚衣衾。斷妄想。禁忿怒。以調和氣血。藥必大補脾土。養肺金。使金能制木。脾無賊邪之害。宜調中。更審虛是。權輕重。辨其所因。而以蘇梗厚樸木通陳皮柴胡白芍大腹皮延胡索為主。寒加熱。熱加寒。虛加補。皆製為大劑。服數十貼。亦有生者。久服藥。忽手足腫。病為自內達外。不久愈。若自手足腫至腹。病為從外入內。難治。其或朝寬暮急。或朝急暮寬。或先脹後喘。宜治脾二陳湯或先喘後脹。宜治肺寧肺湯雖多分別。大法不外乎此。曷言乎。辨其所因也。蓋同屬鼓脹。有因六氣而成者。宜藿香有因七情而成者。宜沉香有因飲食傷而成者。必嘔吐噎噎而脹。宜砂調有因齋血而成者。必青紫筋見。小便仍利。宜代抵有因憂思

太過而成者必二便不利脉虛瀉腸鳴而脹宜蘇子湯有因血熱而脹

者必喘燥虛汗肢厥溲赤尿黑而脹宜人參芎歸湯有因氣為痰所隔而

成者必心下堅滿而脹宜加味枳木湯有因積聚痞塞而成者必膈滿嘔

吐口苦吞酸而脹宜枳殼散有因瀉久而成者必多虛羸狀而脹宜六君子

湯有因老人虛寒而成者必氣弱惡寒不善食而脹宜先服香朴丸再服人參

養榮湯或有因婦人產後敗血入胞而成者必胞不下而脹宜先服香朴丸再服人參

即下宜奪命丹其或素虛弱或過服峻劑而患鼓症必補之宜朝服金匱腎氣丸

晚服補中益氣湯或壯寔人而患鼓症不妨攻之宜先服五痺散二劑再按法服石幹散凡

諸鼓脹之因如此至如蠱脹又是一症不得混蠱為鼓乃由脾胃

家濕熱積滯或內傷瘀血而成蓋人之腹中雖長虬寸白皆賴以

消宿食然太多即為病况如白蟻三尸食肛應聲赤九種腸疰疴

癆瘕等重為類不一皆能使心腹作痛而脹甚則面青口涎治以

補脾健胃為王兼用消導其或因跌撲閃挫負重努力致血瘀於

內而成脹痛亦以補脾健胃為王兼用去瘀生新之品宜參用參

士材新製陰陽攻積丸蓋所謂蠱者若虫侵蝕有蠱壞之義而蠱與鼓之脉

亦相反蠱脉必寔鼓脉必浮蠱與鼓之形更相異蠱之脹以手按

腹隨手而起以其為虫血之積而寔也鼓之脹以手按腹凹而不

起以其為氣而虛也二者皆非輕病此外更有脹滿之病雖亦腹

脹却不至腫不如鼓脹之生死相關或因傷食消導可已宜香砂

或因氣滯行氣即痊宜木香順氣散有久有暫寔者峻下之宜承上鬱則

奪之也音血者用破血藥宜桃仁承氣湯病後氣虛作脹惟補益元氣宜

中益使元氣歸元即愈又有單腹脹即俗名蜘蛛鼓其症四肢不

腫但腹脹其原皆由脾氣虛而傷風與食宜調中健脾丸至若腹脹經久

忽瀉數升日夜不止服藥不效為氣脫最難救治惟濃煎益智仁

湯服之立愈。且夫脹與腫內因則各殊而外形多相似。要有其易辨者。如先腹大後四肢腫爲脹病。先頭足腫後腹大是水也。但腹腫四肢竟不腫爲脹病。臍腹四肢悉腫是水也。皮厚色蒼或一身皆腫或自上而下爲脹病。皮薄色白或自下而上是水也。至若脹病有腫有不腫。腫病有脹有不脹。皆當分辨。茲更卽腫病而條分之。腫不一而爲害。莫有大於水腫者。經曰。水始起也。目窠上微腫如新起之狀。其頸脈動。時咳。陰股間寒。足脛腫。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。頸脈者。足陽明人迎。陽明胃脈。自人迎下循腹裏。水邪乘之。故頸脈動。水之標在肺。故時咳。陰邪結陰分。故陰股間寒也。又曰。三陰結。謂之水。三陰者。太陰脾也。太陰爲六經之主。三陰邪結。則坤土不能運精。如是而二陰腎獨主裏而氣更盛。反來侮土。故氣盛陽不得入。陽不得

入則肺氣不得通調。斯寒水不行而壅。故成水腫之病。蓋中州結則氣壅而關門不利。不利則水聚而從其類。類者本在腎。標在肺也。此言腎與肺之水因脾虛而類聚者。又曰肺移寒于腎。謂之涌水。涌水者水氣客於大腸。如囊裹漿者。形寒飲冷。肺氣不足。則肺寒。母病傳子。則寒可移于腎。腎本寒水。以寒濟寒。故水氣不升而為涌。涌不於腎而於大腸。大腸為肺下流。故如囊裹。不能散也。此言肺腎之寒之水相移。而由臟歸腑者。以上皆致水之原也。由是觀之。水之為病。有不由脾土虛弱不能制水。水逆上行。干及于肺。滲透經絡。流注絡谷。灌入隧道。血亦因而化水。精亦因而化水者乎。顧嘗反覆究之。水雖制于脾。寔主於腎。腎水臟也。元氣寓焉。若土陽虛則命門火衰。既不能自制陰寒。又不能溫養脾土。陰陽不得其正。則化而為邪。蓋氣即火陰。即水陽。旺則化而精能為氣。陽

衰則不能化而水卽爲邪也。夫火盛水虧則病燥，水盛火虧則病濕。故火不能化則陰不從陽而精氣亦皆化爲水，所以水腫。又未有不由於陽虛，腎爲胃關，不惟腎氣不化而閉，卽胃亦能令關閉。故水之聚不待腎水後成，卽所飲湯水亦聚而爲患。蓋胃主中焦，爲水穀之海，胃和則升降出納之氣行，水穀從其道而輸泄，胃不和則出納之關滯，水穀之液皆積而成水。故經言胃所生病，大腹水腫，膝膈腫痛。又言五穀精液因陰陽不和，則并于腸胃中，留於下焦，不得沁入膀胱，則下焦水溢而爲水脹。又言腎者牝臟，勇而勞甚，則腎汗出，遇于風，內不得入臟腑，外不得越皮膚，客于元府，行于皮裏，傳于跗踵。本之于腎，名曰風水，所以水腫。又未有不由于胃虛。經又曰肝腎脉并浮，爲風水。蓋肝腎同居下焦，腎爲陰，主靜，脉常沉，肝爲陽，主動，脉常浮。二臟俱有相火，動于腎者猶龍火。

出于海。動于肝者。猶雷火出于澤。龍起而火隨。風發而水隨。今水
從風。是以腎與肝並浮。猶言腎脉本沉。因從肝化而與之俱浮也。
所以水腫。又未有不由于肝。盛經又曰。三焦為決瀆之官。水道出
焉者。氣化也。氣即是火。三焦病。氣滿。小腹光堅。不得小便。溢則水
流作脹。以火衰則水勝也。所以水腫。又未有不由于三焦。病夫既
明其水之所由來。當必檢乎水之所由治。其一為水腫之常法。腫
在腰以上者。宜發汗。即經所謂開鬼門也。鬼門即勝理宜麻黃差
活防風柴胡牛蒡子葱
白忍冬藤以開之。腫在腰以下者。宜利小便。即經所謂潔淨府也。
或用柳枝煎湯洗。淨府即膀胱。宜澤瀉木通香茹甘草燈心冬葵子蜀葵子葶藶防
巳昆布海藻海金沙赤小豆茯苓猪苓青蛙海蛤白螺鯉魚鯽魚
白魚鱧魚綠頭鴨秋上下分消使陰陽平治水氣可去即經所謂
石代鹽以潔清之。
去苑陳莖是也。苑者積也陳者久也莖者腐也宜甘遂芫花大戟
牽牛子續隨子同大麥麵作麵食或商陸全赤粳
米作飯日食大效。或郁李仁酒服七七粒。或末之和麵作
餅食。或老絲瓜巴豆拌炒。又同陳粳米炒法。巴豆丸服。然皆治

其標而已。尤當理氣養脾。以治其本。治參朮使脾氣寔而健運則

水自行。故宜以參朮為君。更視水之所屬。或為陰。或為陽。加減治

之。蓋病水者。脾必虛。故必健脾為主也。其一治水腫太甚者。權宜

之法。大抵水腫多由肝盛脾弱之人。肝盛則觸怒益脹。而干于脾。

脾弱則食傷不化。而生濕。濕鬱甚則化為水。上至頭。下至足。中滿

身之前後。浮腫如匏。寒冷如石。行坐卧起不安。本宜專利小水。以

除其腫。但腫勢太甚。內而膀胱。外而陰囊。相連緊急。道路阻塞。即

欲利小便。苦無一綫之通。惟宜權開大便。以逐水。隨下而隨補。水

宜硝黃等補救宜參朮等漸漸調理。可痊。若腫不極甚。只宜利小水。以治標。養

脾胃。以治本。而水有陰陽之別。陽水多外因。或涉水冒雨。或感風

寒暑濕。其腫先現上體。其脉沉數。其症兼發熱煩渴。溲赤便秘。則

四磨湯五苓散。陰水多內因。因飲水及茶酒。饑飽勞役房勞。其腫

先現下體。其脉沉遲。其症兼身涼不渴。溲清便利。或澹。宜寔脾飲或小便

便照常。時赤時不赤。晚則微赤。却不澹。亦屬陰也。宜先用木香香

苓等次進。未可驟補。宜分次第治之。有一身惟面與足腫。早則面

甚晚則足甚。面腫為風。宜白蒺藜益母草杏仁葶足腫為水。宜防

附麻黃赤小豆等。或敗荷葉同藜本煎湯洗。或香葉葱白楠木桐木煎洗。更須察二便通秘。別其陰陽

治之。即前文陽水之脹腫。又有內外之別。先脹于內。後腫于外

者。小便赤澹。大便秘結。色澤紅亮。聲音高爽。脉滑數而有力。寔熱

也。宜以治脾為主。宜木香沉香砂仁枳兼理肺。宜桑皮葶藶枳壳

皮。專利小便。宜木通通草茯苓防或發汗。宜麻黃防風羌如氣壯

年少新病者。必瀉其寔熱。可酌用先腫于外。後脹于內者。小便淡

黃。大便不寔。氣色枯白。語音低怯。脉微細而無力。虛寒也。宜以補

脾為主。宜陳皮白朮兼補肺理氣。補肺宜人參黃芪桔梗苡仁理

茯苓甘草

兼補肺理氣

氣宜沉香木香陳香蘇佛手

專利小便。宜五苓散或發汗。宜升麻柴胡如虛甚多寒，必須大劑頻投，方可

救援。宜多用參朮，即桂附乾姜吳茱萸亦可選用古人以金匱腎氣丸治水，誠為切要。

至其他藥品有與本病相關者，亦須研核其所以然。如白芍能于

土中瀉木，忍冬藤能和緩下氣，木瓜赤豆利水下氣交長，片腦雄

鷄金溫中與寬膨並用，牙皂夾燒灰存性，神曲為丸取利甚捷。鷄

屎白炒熱袋盛浸酒空心飲，下水大奇。青蛙入猪肚烹為饌，皆奇

方立效。水之脹腫在女科，又有氣分血分之別。先病水脹，經水後

斷，因而心胃堅大，病發于上者，屬氣分。宜木香調氣散經水先斷，後病水

脹，因而血結胞門，病發于下者，屬血分。宜代抵當湯而又有上半身腫

太甚者。宜羌活防風升麻白芷蘇葉有下半身腫太甚者。宜五苓散加蒼朮木通有腫而

心腹堅脹喘滿者。宜當歸散有頭身俱腫，腹前脹疼者。宜蠲痺丸有腫而不

能食，不能臥，小便秘者。宜白朮木香散有大病後腫，明屬脾虛，不能通調

水道者。

宜補中益氣湯送六味丸。

有腎水不足。虛火燥金。小便不生而患腫者。

急補之。

宜補中益氣湯。六味丸互用久服自效。

慎與疏風行水。將貽性命之憂。

宜急投金

匱腎氣丸。

有血熱生瘡。變為腫病。煩渴。小便少者。經曰。純陽者腫。

四肢。

此熱症也。如便閉。更須和氣。

宜消風散毒散。

有遍身水腫。喘滿。小便

閉澹。諸藥不效者。

宜導水茯苓湯。

有腫而因于風者。

宜黃芪防已湯。

有腫而因于

寒者。

宜中滿分消湯。有熱者忌。

有腫而因于熱者。

宜中滿分消丸。有寒者忌。或神芎導水丸。

有腫而

因于濕者。

宜二蛟散。如虛宜間服。加味胃苓散。此二方百發百中。無不效。

有孕婦遍身浮腫。腹脹

滿。小便不利者。

宜防已湯。葶藶散。

有產後腫滿。喘息而渴。小便不利者。

宜大

凡此皆水病之支分。派委所可溯流以窮源者也。吾因舉水

之發源。于五臟者。而分言之。大凡水腫。必有目胞上下浮腫。肢體

沉重。咳嗽。怔忡。腰間清冷。小便黃澹。皮膚光亮。諸狀。今若心水病。

必兼身重。少氣。不得卧。煩而躁。其陰必大腫。肝水病。必腹大。不能

轉側脇膈痛時時津液生小便續連肺水病必身腫小便難時鴨
 澹脾水病必腹大四肢重津液不生少氣小便難腎水病必腹大
 臍腫腰痛不得卧陰下濕足逆冷而黃瘦大便反堅皆當審形辨
 脉知其水從何經而來于治水藥中各加引經之品以開導之各
 經藥已五臟之外又有九種水其根緣症狀治法有可一一明之
 者一曰青水先從兩脇腫起根在肝王治宜二曰赤水先從舌根
 腫起根在心王治三曰黃水先從腰腹腫起根在脾王治四曰白
 水先從足腫起根在肺王治五曰黑水先從陰上腫起根在腎王治
 六曰元水先從面頰腫起根在外腎王治七曰風水先從四肢
 腫起根在膀胱王治八曰高水先從少腹腫起根在小腸王治九
 曰氣水或盛或衰根在三焦王治赤小豆右九種藥等分配合
 三九日三服忌鹽凡患水腫者皆自此推之可知其所從來而治
 二三十日自愈

之。不。差。矣。大。約。水。腫。之。病。唇。黑。傷。肝。缺。盆。平。傷。心。臍。突。傷。脾。背。平。傷。肺。足。心。平。傷。腎。五。傷。者。必。死。不。可。不。知。之。也。血。腫。一。症。尤。爲。奇。害。其。爲。狀。四。肢。浮。腫。皮。肉。間。必。有。紅。痕。赤。縷。皆。由。血。溢。離。經。留。滯。于。中。與。水。濕。相。化。因。變。爲。水。也。宜調榮飲或酌用代抵當湯而。產。婦。敗。血。留。滯。以。致。化。水。亦。能。成。腫。必。四。肢。浮。面。皮。黃。宜小調經散不。論。婦。人。女。子。經。水。爲。患。亦。能。化。水。四。肢。腫。小。便。不。通。此。血。不。歸。經。之。故。宜椒三者皆不易治皆。水。腫。病。之。類。也。石。水。一。症。內。經。雖。有。其。名。却。無。明。文。然。本。章。雖。未。詳。言。而。陰。陽。別。論。篇。曰。陰。陽。結。邪。多。陰。少。陽。曰。石。水。少。腹。腫。以。既。見。于。陰。陽。篇。故。不。必。重。出。也。並。非。闕。文。其。理。自。可。三。叅。邪。應。作。斜。陽。結。腫。四。肢。是。在。陽。之。發。處。陰。結。便。血。是。在。陰。之。聚。處。今。邪。交。入。陰。陽。而。交。結。之。勢。必。結。于。陰。陽。之。所。共。生。處。矣。生。陰。惟。腎。生。陽。惟。胆。皆。根。原。下。焦。而。腎。職。行。水。胆。職。沁。水。若。兩。家。交。壅。

止所謂不能通調水道也。然陰多陽少，則腎病為多。腎病則陰之
真水沉寒而無陽以化氣。此病固不在膀胱而在腎。腎既留水不
能化精，故石堅一處，惟見少腹而不及他所也。水蠱一症，因水毒
之氣結聚于內，遂令其腹漸大，動搖有聲，常欲飲水，皮膚粗惡。其
原多因他病久而變成。蓋亦有蠱敗之義焉。故亦名蠱，其為症治
有可指陳者。或因雨濕而浮腫。宜平胃散加白朮赤苓草薈仁或飲水過多而浮
腫。宜胃苓湯或久喘後積水氣而浮腫。宜葶芩或久瘧變水氣而浮腫。宜黃芩
甲或久痢變水氣而浮腫。宜補中益氣湯加附子此等皆水症之別也。而水
症之外，又有結陽症。內經曰：結陽者，腫四肢。註曰：素管氣疾濕熱
加之，氣濕熱故為腫也。邪氣漸甚，正氣漸微，陽氣衰少，致邪伐正
氣不能宣通，故四維發腫。諸陽受氣於四維也。今人見手足關節
腫痛，槩以為風症治者，誤矣。宜犀角湯嗟乎，脹腫之為患重且大如此。

倘忽視之不幾委人命於草莽乎業師孫慶會先生嘗謂余曰腫門惟水病難治其人必真火衰微不能化生脾土故水無所攝泛溢于肌肉間法惟助脾扶火足以概之而助脾扶火之劑最妙是五苓散肉桂以益火火煖則水流白朮以補土土寔則水自障茯苓豬苓澤瀉以引水則水自滲洩而可不爲患每見先生治人水病無不用五苓散加減無不應手而愈如響應者可見無人不。知五苓散而不能用治水病以致決潰而死者皆未明病之根源方之奧妙而尊之信之加減以收功也然其加減則必有神明乎藥物之性洞悉乎病根所在者而後所加所減悉與原方配合悉與本病無乖故可投之立效否亦無益也

脈法 內經曰其脈大堅以濇者脹也又曰脈盛而繁曰脹

脈訣曰脹滿脈絃脾制于肝洪數熱脹遲弱陰寒浮爲虛滿緊

則中寔浮則可治。虛則危急。得效曰。關上脉虛則內脹遲而滑者。脹虛而緊濇者。脹或弦而遲。或浮而數。皆脹也。又曰。諸氣脹滿。浮大可治。虛小難治。此係脹滿之脉。

脉法。仲景曰。脉得諸沉。當責有水。身體腫重。脉經曰。水病

脉大者可治。微細者不可治。水病腹大如鼓。寔者生。虛者死。

東垣曰。水氣得沉脉則逆。比陰脉也。得效曰。水氣浮大則宜。

沉細則愈而復作。又曰。上氣浮腫。浮滑可安。微細難治。正傳

曰。水腫脉多沉伏。又曰。病陽水兼陽症。脉必沉。數病陰水兼陰

症。脉必沉遲。三因曰。陽虛陰寔。爲水必矣。此係浮腫之脉。

脹滿爲真臟病。丹溪曰。脹滿由脾虛之極。乃真臟病。如反胃

癆瘵。亦皆真臟受病。凡人真臟不病。則五行相生相制。以適于

平。雖不服藥而自愈。如火極傷金。有水以制之。有土以生之之。

類所謂亢則承。害乃制也。雖然亦有惡藥忌醫而悞之者。蓋正氣與病邪不兩立。一勝則一負。久則病劇。正脫而不免於死。然則有病不服藥。可乎。不延醫。可乎。

脹滿症治 內經曰。飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之則入五臟。入五臟則填滿閉塞。又曰。腹滿填脹。支脇胛脇。下厥上胃。過在足。太陰陽明。又曰。脹者。皆在於臟腑之外。排臟腑廓胸脇。脹皮膚。故名脹。內經註曰。寒氣在上。聚而不散。則成脹。脈經曰。胃中寒則脹滿。仲景曰。腹滿。按之痛者。為寔。不痛者。為虛。又曰。腹脹時減。復如故。此為寒。宜溫之。又曰。脹滿不減。減不足言。須當利之。入門曰。凡脹初起。是氣久則成水。治比水腫更難。蓋水腫飲食如常。鼓脹飲食不及。每病根深。痼必三五年而後成。治腫補中行濕。足矣。治脹必補中行濕。兼以消導。

更斷鹽醬音樂妄想。不責速效。乃可萬全。又曰。脹有虛寔。虛脹陰寒爲邪。吐利不食。時脹時減。按之則陷而軟。寔脹陽熱爲邪。身熱咽乾。常脹內痛。按之不陷而硬。醫鑿曰。中滿腹脹者。其面目四肢不腫。而肚腹脹起。中空似鼓者。是也。本事曰。臍腹四肢悉腫者。爲水。但腹脹四肢不甚腫者。爲蠱。蠱卽脹也。四春曰。脹病亦謂鼓脹。其脇痛面黑。是氣鼓。脇滿少腹滿。身上有血絲縷。是血鼓。噎氣作酸。飽悶脹腹。是食鼓。惡寒手足厥冷。瀉水。是水鼓。胸腹脹滿有塊如鼓者。是痞散成鼓。

脹病有七。醫旨曰。一曰寒脹。腹滿濡。時減。吐利厥冷。宜溫之。二曰熱脹。以陽并陰。則陽寔陰虛。陽盛生外熱。陰虛生內熱。脉必浮數。浮爲虛。數爲寔。陰虛不能宣導。飲食如故。腹中脹滿者。爲寔脹。三曰穀脹。卽食脹。失饑傷飽。痞悶停酸。朝則陰消。陽長。

穀氣易行。故能食。暮則陰長陽消。穀氣難化。故不能食。是爲穀
脹。四曰水脹。脾主水。濕水浸腸胃而溢皮膚。漉漉有聲。怔忡喘
息者。是。五曰氣脹。七情鬱結。氣道壅塞。上不得降。下不得升。身
體腫大。四肢瘦削。六曰血脹。煩躁。漱水。迷忘。驚狂。痛悶。嘔逆。小
便多。大便黑。婦人多有之。七曰蠱脹。但腹脹而四肢頭面不腫
是也。而此症之類。又有名蛛。蜘蛛。蠱脹者。單腹腫大。四肢極瘦。皆
由脾氣虛極。眞臟已傷病也。古方雖有諸蠱保命丹。用肉蓯蓉
三兩。紅棗青礬各一斤。入罐內。煨烟盡爲末。再將香附一斤。便
製麥芽一斤半。炒爲末。和前末糊丸。食後酒下。二三十丸。以治
之者。然爲死症。未必盡效也。

脹滿不治症。靈樞曰。腹脹身熱。脉大一逆也。腹鳴而滿。四肢
清泄。脉大二逆也。腹大脹。四末清脫。形泄甚。三逆也。腹脹便血。

四逆也。並不治。得效曰腹脹未久。或脹或消。腹皮稍軟。不泄不喘。此則隨治隨差。若臍心突起。利後腹脹急。久病羸乏。喘息不得安。名曰脾腎俱敗。不治。又曰腹滿欬逆。不得小便。不治。腹大滿而下泄。不治。綱目曰腹滿或兼身熱。或兼如瘧。皆不治。直指曰久病羸乏。卒然腹滿。喘息不得。與夫臍心突起。或下利頻頻。未見一愈者矣。

浮腫徵兆。內經曰諸有水氣者。微腫先見于目下。以水者陰也。目下亦陰也。腹者至陰之所居。故水在腹也。必使目下先腫也。蓋按如男子陰囊女人陰戶兩傍亦必先微腫。又曰腰脊者身之大關節也。肢脛者人之管以趨翔也。莖垂者身中之機。陰精之候。津液之道也。故飲食不節。喜怒不時。津液內溢。乃下流于睪。血道不通。日夜不休。俛仰不便。趨翔不能。此病榮然有水也。

浮腫形症 內經曰水病下為跗腫大腹上為喘呼不得卧者

標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得卧又曰濕勝則

濡泄甚則水閉跗腫 仲景曰水病有五種一風水其脈自浮

外症骨節疼痛惡風二皮水脈亦浮外症跗腫按之没指不惡

風其腹如鼓不渴當發其汗三正水脈沉遲外症自喘四石水

脈沉外症腹滿不喘五黃汗脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫

久不愈必生癰膿又曰久則肌肉潰爛陰囊足腫水出 直指

曰其狀目胞上下微腫如裹水通身浮腫喘咳怔忡股間清涼

小便濇黃皮薄而光手按成窟舉手即滿此浮腫也

浮腫可治不治症 入門曰凡浮腫陰囊軟者可治又曰男從

脚下腫而上女從頭上腫而下皆為逆不治 得效曰浮腫善

症男從上而下女從下而上所患未久旋利腫退喘定則愈矣

又曰。凡水腫大喘。氣粗不食。乃腎水盈溢。上行旁侵於肺也。不治。直指曰。大凡腫病。先起于腹。而後散于四肢。可治。先起于四肢。而後入于腹。不治。又曰。蠱脹而肚上有青筋。或腹滿而大便滑泄。或久瘧而變作虛浮。與夫肝傷而唇黑。心傷而缺盆平。脾傷而臍突。腎傷而足心平。肺傷而背平。皆不治之症。又曰。卒唇腫而蒼黑者死。掌腫無紋者死。臍腫凸出者死。陰囊陰莖俱腫者死。脉絕口張足脹者死。足跗腫脹如斗者死。

水腫禁忌 入門曰。凡水腫。極忌甘藥。助濕作滿。 本草曰。病嗽及水。全宜忌鹽。

胸腹脹悶導引 保生秘要曰。雙手交叉。低頭觀臍。以兩手貼胸口。將身往下。不論數推沸。能寬胸脹。止腹疼。兼後功效。

運功 保生秘要曰。先定歸元。後行斡旋。至胸前接撒散法。左

右分開。如未通暢。以良背佐之。無不效矣。

臄脹導引 保生秘要曰。坐定擦手足心極熱。用大指節仍擦

摩迎香二穴。以暢肺氣。靜定閉息存神半晌。次擦手心。摩運臄輪。按四時吐故納新。從立雍竅轉下至丹田。捫氣面撮穀道。緊尾間。提升泥丸。下降宮。復氣海。週天一度。如此七七。身心放下。半炷香許。如久病難坐。用得力人扶背。慎勿早睡。恐氣脉凝滯。神魂忝錯。效難應期。手足可令人摩擦。患輕者。一七能取大效。重則二七三七。五臟盡消。屢屢取驗。妙入神也。

運功 保生秘要曰。反瞳守歸元。念四字。訣定後。斡旋。推入大腸。曲行。提回抱守。能清鼓脹。氣脹加推散四肢。時吐濁吸清。飲食宜少。降氣安心。而食自然加。或病酒過用湯水而成。宜通其二便。摩臄輪腎輪二穴。吹噓其氣。或開腠理。以洩微汗。其

脹自效。血脹加運血海效。

痞滿脾病也。本由脾氣虛。及氣鬱不能運行。心下痞塞填滿。故有

中氣不足不能運化而成者。有食積而成者。有痰結而成者。有濕

熱太甚而成者。虛則補其中氣。宜調中益氣湯是則消食。宜資生丸豁痰。宜導痰湯

除濕。宜二陳湯加猪苓澤瀉有濕熱清熱。宜當歸拈痛湯而消導之。亦不可用峻劑。

致傷元氣。又有傷寒下早。因而成痞。結胸則從傷寒門治之。夫痞

與脹不同。痞則內雖覺其痞悶。而外無脹急之形。痞祇見於胸脇

腕膈間。脹則連腹少腹都急也。

脉法 仲景曰。凡痞關脉須沉。若關脉沉者。三黃瀉心湯。

痞滿症治 仲景曰。心下滿而不痛。此為痞。陶節菴曰。胸滿

者。胸膈間氣塞滿悶也。非心下滿。脇滿者。脇肋下氣填脹滿也。

非腹中滿。蓋邪自表傳裏。必先胸脇。以至心腹入胃。是以胸滿

多帶表症。宜發汗惟脇滿多帶半表半裏小柴胡湯加枳寔和之。

治脹腫方五十七

藿香正氣散

總治

藿香

紫蘇

白芷

厚朴

桔梗

木香調氣飲

又

白蔻仁

木香

藿香

砂仁

甘草

蘇子湯

又

大腹皮

蘇子

草果

半夏

厚朴

甘草

陳皮

木通

白朮

枳寔

人參

加味枳朮丸

膈脹

枳壳

肉桂

紫蘇

陳皮

檳榔

五靈脂

白朮

木香

黃芩

半夏

甘草

調中健脾丸

鼓脹

人參

蒼朮

黃芪

吳萸

茯苓

白朮

沉香

陳皮

半夏

香附

查肉

苡仁

黃連

白芍

蘇子

澤瀉

草薢

藤子

五加皮

全瓜蒌

川椒

礞

荷葉

腹皮湯

打黃米粉糊丸

此方分量合法詳後痞滿方內查之可也

二陳湯

脹喘 茯苓 陳皮 半夏 甘草

寧肺湯

喘脹 知母 黃芩 桑皮 貝母 花粉 杏仁

沉香降氣散

七情 沉香 香附 烏藥 砂仁 甘草

香砂調中湯

食傷 藿香 砂仁 茯苓 蒼朮 半夏
厚朴 青皮 陳皮 枳寔 甘草 便瀉去
枳寔 青皮 加麥芽 山查 黃連 肉果

代抵當湯

畜血 生地 桃仁 蓬朮 大黃 芒硝 當歸

人參芎歸湯

血熱 人參 肉桂 烏藥 蓬朮 木香
砂仁 炙草 川芎 當歸 半夏 蘇葉
五靈脂

枳壳散

氣痞 三稜 蓬朮 枳壳 陳皮 枳榔
肉桂 厚朴 乾姜 青皮 甘草 木香
肉蔻 益智仁

六君子湯

瀉虛 人參 茯苓 白朮 炙草 陳皮
半夏

香朴丸

老人 厚朴二錢 附子七分 木香三分

人參養榮湯

又富歸 肉桂心 人參 黃芪 陳皮 白芍
五味子 白木 熟地 炙草 茯苓 蓮志

奪命丹

血敗 丹皮 乾漆炒烟盡 大黃各一錢
附子五分

金匱腎氣丸

熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓
澤瀉 附子 肉桂 牛膝 車前
病虛 人參 黃芪 當歸 白芍 陳皮
甘草 柴胡 升麻 當歸 白芍 陳皮

補中益氣湯

壯盛 人參 茯苓 當歸 白芍 川芎
細辛 白木 甘草 五味子 姜

五痺湯

石幹散

石幹 枳榔 黑丑頭末 海金沙各一錢
又 石幹 枳榔 黑丑頭末 沉香 木香各五分
錢 葶藶 入分 西珀 沉香 木香各五分
送 共為末先服五痺湯二帖後以葱白湯空心
服 此末一錢隔日再服輕者二服重亦不過三
服 愈後服健脾藥 忌食監醬暈腥

參朮健脾丸

人參 白朮 陳皮 茯苓 當歸
白芍 炙草 大棗

陰陽攻積丸

又 吳萸 乾姜 官桂 川烏各一兩 玄
厚朴 枳實 半夏 橘紅 茯苓 枳榔
桔梗各八錢 巴霜另研五錢 皂角六兩煎

汁送丸每服八分漸加至一錢半姜湯下

木香順氣散

氣滯 丁香 檀香 木香 薏仁各二兩
藿香 炙甘草各八兩 砂仁四兩 每服二錢滾湯入鹽少許下

承氣湯

寔脹 大黃 芒硝 厚朴 枳寔 此大承氣湯去芒硝各小承氣湯
畜血 大黃 芒硝 桃仁 肉桂 甘草

桃仁承氣湯

陽水

四磨湯

下腫 肉桂 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉

五苓散

疏鑿飲子

陽水 澤瀉 商陸 羌活 椒目 木通
秦艽 枳櫛 茯苓皮 大腹皮 赤小豆
陰水 厚朴 白朮 木瓜 附子 木香
草果 乾姜 茯苓 大腹皮 加姜

寔脾飲

刃 附子二兩 木香 茴香 川椒 厚朴
獨活 白朮 橘紅 吳萸 肉桂各一兩
澤瀉二兩 肉果 枳櫛各五錢

復元丹

澤瀉二兩 肉果 枳櫛各五錢

當歸散

心腹堅 當歸 丹皮 肉桂心 木香 木通 赤芍 枳櫛 赤

心腹堅 當歸 丹皮 肉桂心 木香 木通 赤芍 枳櫛 赤

心腹堅 當歸 丹皮 肉桂心 木香 木通 赤芍 枳櫛 赤

蟠桃丸

身腫一錢半 木香 沒藥 乳香各三錢
琥珀一錢半 生白丑頭未六分 黑丑頭未
牙皂汁浸半日 半生半焙熟八分 枳榔一錢
半半用生半用皂角汁浸焙熟 皂角水打糊
丸每服二錢半 五更砂糖湯下神效
此專治水腫若治鼓脹不效

白术木香散

不食 白术 枳榔 赤苓 猪苓 澤瀉各
一錢半 木香 甘草各一錢 官桂七分
滑石三錢 陳皮八分 加姜

六味丸

病後 熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓
澤瀉

消風敗毒散

血熱

導水茯苓湯

諸藥不效 赤苓 麥冬 澤瀉 白术各二
兩 桑皮 紫蘇 枳榔 木瓜各一兩 大
腹皮 陳皮 砂仁 木香各七錢半 共為
粗末每五錢加燈草七根煎連進三服小水自利

黃芪防已湯

因風 黃芪 防已 白术 甘草 姜 棗

中滿分消湯

因寒 黃芪 吳萸 厚朴 草薹 黃柏各
五分 半夏 茯苓 木香 升麻 益智仁
各三分 人參 青皮 當歸 黃連 葶苈
茄 澤瀉 生姜 乾姜 麻黃 柴胡 葶苈
川

中滿分消丸

因熱 黃芩 黃連 姜黃 白朮 人參
炙草 茯苓 猪苓 乾姜 砂仁 半夏
枳實 知母 澤瀉 厚朴 陳皮 蒸餅為

神芎導水丸

又 每百丸白湯下 川芎 薄荷 黃連 黃芩
大黃 黑丑 頭末 有血積加肉桂
因濕 三年老黃米炒為末 芒硝各三兩
將硝鍋內鎔化炒乾為末和米研細大人服三

二蛟散

錢小兒一錢半黑糖調服至午便一次晚再便
一次病久虛者間服加味胃苓丸

加味胃苓丸

因虛 白朮 白芍 陳皮 茯苓 人參
藿香 山查 厚朴 猪苓 澤瀉 半夏
甘草 女人加香附 本方總加姜燈心至重
不過五服 此二方百發百中無不愈者

防已湯

孕婦 防已 桑皮 赤苓 紫蘇 木香
又 郁李仁 葶藶 白朮 茯苓 桑皮

葶藶散

大調經散

產婦 大黑豆五錢 茯苓三錢三分 西珀
三分半 每末三錢紫蘇湯下日三服 枳櫛
如神 蓬朮 川芎 當歸 白芷 枳櫛

調榮飲

如神 蓬朮 川芎 當歸 白芷 枳櫛

小調經散

椒目丸

又 沒藥 西珀 桂心 白芍 當歸各一錢
 細辛 麝香各五分 酒姜汁調下
 經水 椒目 甘遂 附子 干金子 郁李
 仁 黑牽牛 五靈脂 吳萸 當歸 延胡
 索各五錢 芫花一錢 蜆青十枚去頭疑足
 全米炒 紫蠶十枚製同 蚘青 胆凡一錢
 石膏二錢 糊丸 芡寔大橋皮湯下一丸

平胃散

水盪 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

胃苓湯

又 葶藶 防已 木通 杏仁 川貝各一兩
 又 棗肉丸 桑皮湯下治肺氣喘促面目浮腫

葶藶丸

黃甲丸

又 結陽症 犀角 元參各一錢 升麻 木通
 各八分 連喬 柴胡各六分 沉香 射干
 甘草各五分 芒硝 麥冬各四分

犀角湯

鋪臍藥餅

外治 真輕粉二錢 巴豆四兩 生硫黃一錢
 研勻成餅先用新棉鋪臍上次鋪藥餅外
 以帛緊束之約人行五七里許自然瀉下惡水
 待下三五次即去藥以溫粥補之一餅可治一

敷藥

二十人久患者隔日取水一方治水蠱商陸
根赤者杵爛貼臍上以帛縛定水從小便出
引大戟 荒花 甘遂 海藻 等分醋糊
和麴少許攤絹上貼腫處口咬甘草不過三五
時水即下矣

灸法

又分穴在臍上一寸宜灸如年數壯中
腕穴在臍上四寸上一寸居岐骨與臍之分
中灸二七壯 灸神闕以鹽滿臍中灸之
以上外用三方皆專治水腫 凡患水腫者切
忌用刺刺之水盡即死

附載嵩崖水腫神方

回生丹

專治 青皮 陳皮 三棱 蓬朮 各三錢
連喬三錢 用巴豆一兩 五錢 同炒 去豆 木香
甘遂 商陸 木通 澤瀉 乾漆 炒 至烟
盡 萊菔子 各三錢 赤苓 桑皮 椒目 各
五錢 胡椒 一錢 黑丑 一兩 醋糊 凡初服
酒葱湯五更下十五丸 二服 陳皮 桑皮 湯下十
八九三服 射干 湯下二十九丸 凡患水腫忌食
鹽魚肉 鷄麵 羊湯 七件 並房事

治痞滿方八

一 脾 腫脹方 痞滿方

調中益氣方

中氣虛 人參 黃芪 白朮 甘草 五味子 當歸 升麻 柴胡 陳皮 白芍 橘紅 查肉

資生丸

消食 人參 白朮 茯苓 桔梗 藿香 扁豆 黃連 神曲 澤瀉 蓮肉 麥芽 甘草 薏仁 山藥 蓮肉

豁痰丸

導痰 南星 半夏 赤苓 枳寔 橘紅 甘草 加姜 陳皮 半夏 甘草

二陳湯

除濕 茯苓 陳皮 半夏 甘草 黃芩 羌活 甘草 茵陳 人參 葛根 升麻 蒼朮 苦參 當歸 防風 知母 白朮 猪苓 澤瀉

當歸拈痛湯

濕熱 黃芩 羌活 甘草 茵陳 人參 葛根 升麻 蒼朮 苦參 當歸 防風 知母 白朮 猪苓 澤瀉

三黃瀉心湯

脉浮

小柴胡湯

和解

調中健脾丸

單腹脹 五加皮 蒼朮 人參 黃芪 茯苓 苓各二錢 陳皮 半夏 香附 查肉 苳仁各三錢 吳萸 白芍 黃連各二錢半 蘇子各一錢半

萊菔子 草薏仁 澤瀉 蘇子各一錢半 沉香六分 用瓜萋一个挖一孔入川椒三錢 碱二錢外用紙糊監泥封固晒乾火煨去泥并

葉共爲末荷葉大腹皮煎湯打黃米粉糊丸每
服百丸湯下日三服

沈氏尊生書卷六

雜病源流犀燭 藏腑門

心病源流 伏采 心瘧 心痛

沈金鰲撰

手少陰心脉起心中出屬心系下隔絡小腸其支者從心
系上挾咽繫目系其直者復從心系上肺下出脇下循
臑內後廉行太陰心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後
銳骨之端入掌內後廉循小指之內出其端次注于手太
陽小腸經每日午時週身氣血俱注于心 手少陰心
經少血多氣

十二經皆聽命于心故為君位南方配夏令屬火故為君火十二
經之氣皆感而應心十二經之精皆貢而養心故為生之本神之
居血之宗脉之宗蓋神以氣存氣以精宅其理洵不誣也惟心精
常滿故能分神於四臟惟心氣常充故能引精於六腑此所以為
心之大槩也心與腎連經曰心舍脉其主腎經不以其尅而反以
為主故必腎水足而後心火融腎水不足必至心火上炎而心與

腎百病蠱起矣。故心當無病時養之之法有二。一從本經以養其氣。勿過思抑志。或事未至而迎事已往而戀。使神明耗散。若過用其心。則傷其氣。氣傷並傷其精。而神無以爲守。試觀孔子毋意毋必。毋固毋我。孟子子必有事焉。勿正勿忘。勿助養心之法。至孔孟爲已極。孔孟並未嘗言醫。其所以養心。曷嘗有外於是哉。一從腎經以養其精。勿縱情房慾。勿貪戀女色。致相火常炎。不能握固。若守腎無節。則傷其精。精傷遂傷其氣。而水不能制火。陰不能爲陽宅。而水氣因以凌心矣。是以象川翁曰。精能生氣。氣能生神。榮衛一身莫大于此。養生之士。先寶其精。精滿則氣旺。氣旺則神旺。神旺則身健身健。則少病。朱丹溪曰。主閉藏者腎。司疎泄者肝。二臟皆有相火。而其系上屬於心。心君火也。感則動。心動則相火亦動。而精自走。可知精之走泄。固由于腎。累于肝。傷于心。一病則俱病。象

川丹溪明揭其旨固可爲千古養心家炯戒也。然則心失所養而心病，腎失所養而心不亦病乎？且夫心主血，血卽精也。心氣原自有餘，特精傷而失血，心便不足。故血盛則神明湛一，血衰則志氣昏蒙。凡火之有餘，皆由血之不足，而血之不足，又能使火益就衰也。然則心病之有餘不足，詎得與運氣司天之火淫火鬱徒屬乎？火者同視哉。亦惟握精以固其氣，養陰以凝其神，以調劑其有餘不足，使歸于和而已。以上皆言心之所由致病，與養其心所以至於無病也。然而病不能已，試據經以觀心之病。經曰：心病者，胸中痛，脇支滿，脇下肩背胛間痛，兩臂內痛，虛則胸腹痛，大脇下與腰相引痛。就經所言病，皆在血脈，而不在心，何也？以心爲血脈之主，故其寔其虛，皆不見本臟而在血脈。其在血脈，必先於在經絡者病之也。若胸腹腰脇間皆心與心包之所在，故先病於本經也。其

虛而腹胸大。則緣脾胃不上。納氣於心。而然。虛而脇下與腰相引痛。又緣肝腎不上。貢精於心。而然。此其病非止于本經絡。可由本經絡而推者也。經又曰。若心經絡病者。動則噓乾。心痛渴而欲飲。以及所生病。目黃。脇痛。臑臂內後廉痛。厥掌中熱痛。其皆爲本經絡病。固已。而其病却能及心。蓋支脈挾咽病。則通於心。故噓乾者。心火必炎。故心痛火炎。則陰耗而心液乾。故必渴。且心部在陽明。心痛而熱。及陽明。陽明亦必熱。故渴而欲飲。目黃等症。皆心脈熱逆之故。所謂經絡病。而及心者。如此。經又曰。精氣并於心。則喜驚而奪精。汗出于心。又曰。憂思則傷心。何謂歟。喜者。心之浮陽。心好勝。精氣并於心。則心有餘。故陽浮動而喜。驚者。肝胆虛怯之氣。肝胆失利。不能衛心。故心氣內空。而奪精神。不守榮。而汗出。思者。心之神明。思而弗遂。則憂。憂思不已。必神明內擾。而往來憧憧。故傷

心。凡。諸。心。病。皆。由。於。不。能。養。精。以。馭。氣。而。使。神。以。氣。存。氣。以。精。宅。也。欲。求。心。無。病。者。可。不。於。此。加。之。意。哉。

脉法 脉訣曰心脉芤陽氣作聲或時血痢吐交橫溢關骨痛
心煩躁更兼頭面赤騁騁大熱由來面赤風燥痛面色與心同
微寒虛惕應寒熱急則腸中痛不通寔大相兼并有滑舌滑心
驚語話難單滑心熱別無病濇無心力不多言沉緊心中逆冷
痛弦時心急又心懸 又脉訣曰五臟不同各有本脉左寸之
心浮大而散 仲景曰心傷者其脉弦

心病緣由症治 靈樞曰邪在心則病心痛善悲時仆眩又曰
心藏脉脉舍神心氣虛則悲寔則笑不休 素問曰腎傳之心
病筋脉相引而急病名曰瘵又曰心熱者色赤而絡脉溢也又
曰大骨枯大肉陷胸中氣滿喘不休內痛引肩項期一月死真

臟乃與之期日。又曰：心病者，日中慧，夜半甚，平旦靜。又曰：心苦緩，急食酸以收之。註曰：苦緩，心氣虛也。又曰：心欲熉，急食鹹以熉之。用鹹補甘瀉之。又曰：心病禁溫食熱衣。難經曰：憂愁思慮則傷心。仲景曰：心家陰氣衰者為癡，陽氣衰者為狂。又曰：心傷者勞倦則頭面赤而下重，心中痛而自煩發熱，臍上跳。其脈弦，此為心藏傷所致也。難經曰：外症面赤口乾善笑，內症臍上有動氣，按之牢若痛，其病煩心，心痛，掌中熱而腕有是者，心也。無是者非也。

手少陰無腧。靈樞曰：少陰者，心脈也。心者，五臟六腑之大主也。其臟堅固，邪不能容，容則傷心，心傷則神去而死。故諸邪在於心者，皆在心包。心包者，心主之脈也。故少陰無腧。又曰：其外經病而臟不病，故獨取其經于掌後銳骨之端，即神門也。

心絕候。靈樞曰：手少陰氣絕，則脈不通。脈不通，則血不流。血不流，則色不澤。故其面黑如漆。柴者，血先死。壬日篤，癸日死。仲景曰：形體烟煤，直視搖頭者，此爲心絕。脈經曰：心絕一日死。何以知之？肩息面視立死。一云二日死。

心氣滯澇保養法。保生秘要曰：凡人氣旺則血榮而潤澤，氣絕則血枯而滅形。故氣虛弱滯澇而成病。如滯於心，心爲一身之主，統領血海。故心血少，則神不定，寢不安，百病集作。諸痛痒瘡癢，皆屬心火。當常呵以泄其火，吸以和其心。諸心切勿食穢氣觸我靈。夏至夜半後，地氣一陰生，大熱勿食冷，受寒霍亂侵，并忌房中事。元氣離命門，大抵當甚者，人善于養心，則無秋患。時當飲六一燈心湯。荳蔻香茹水。醉飽勿頂風前卧。慎此則無患矣。

心臟修養 養生書曰。常以四月五月朔望清旦。面南端坐。叩
金梁九漱。元泉三靜。思注想。吸離宮赤色氣入口。三吞之。閉氣
三十息。

心臟導引 臞仙曰。可正坐。以兩手作拳。用力左右互相築各
六度。又可正坐。以一手按腕上。一手向下托空如重石。又以兩
手相叉。以腳踏手中各五六度。能去心胸間風邪諸疾。閉氣爲
之良久。閉目三嚙津。三叩齒而已。

心之積曰伏梁。起臍上大如臂。上至心下。久則令人煩心。身體脛
股皆腫。環臍而痛。脈沉而菀。皆由心經氣血兩虛。以致邪留不去
也。治宜活血涼血。散熱通結。宜伏梁九斯得之矣。

伏梁有二症。內經曰。帝曰。病有小腹盛。上下左右皆有根。此
爲何病。可治否。岐伯曰。病名曰伏梁。裏大臞血。居腸胃之外。不

可治。治之每切按之致死矣。帝曰：人有身體股肱皆腫，環臍而痛，是爲何病？岐伯曰：病名伏梁，此風根也。其氣溢于大腸，而着于膏肓之原，在臍下，故環臍而痛，不可動之。動之爲尿瀉之類。此二病同名而寔異也。

心痛包絡病，寔不在心也。心爲君主，不受邪。或君火衰盛，大寒觸犯心君，亦或汗血冲心，素無心病，卒然大痛無聲，咬牙切齒，舌青氣冷，汗出不休，手足青過節，冷如冰，是爲真心痛。且發夕死，夕發旦死。若不忍坐視，或使心經寒散，亦可死中求活。宜用猪心煎湯，去渣煎麻黃肉桂附子。如但起床搔席，面無青色，四肢不厥，痛亦不至無聲，卽非真心痛。由包絡捧心，或寒或痰，或虫或食，上干包絡，脂膜緊急，作痛。宜各從其類，審脉用藥。總治宜必應湯。夫心主諸陽，又主陰血，故因邪而陽氣鬱者痛，陽虛而邪勝者亦痛，因邪而陰血凝注者痛，陰虛

而邪勝者亦痛其痛分九種曰食必飽悶噫敗耶氣由食生冷或

食物過多也。宜青皮丸曰飲必惡心煩悶時吐黃水甚則搖身作水聲

由傷水飲痰涎積聚也。宜小胃丹胃苓湯熱飲加黃連甘草飲流

注胸膈痛。宜三花神佑丸曰風因傷風冷或肝邪乘心兩脇引痛也。宜羌活荆

芥等曰寒外受寒當溫散內受寒當溫利久則寒必鬱當疏解。總治宜木

湯附虛寒當溫補。宜歸脾湯加乾姜肉桂菖蒲腎寒乘心痛則心懸如饑泄利下

重。宜五積散寒氣客背俞之脉則血脉澹血脉澹則血虛血虛則痛其

俞注于心故相引而痛。宜桂枝湯四七湯神效散曰熱必身熱煩躁掌熱口渴

便秘。面目赤黃。大熱作痛。由積熱攻心。或暑熱入心也。宜金鈴子散剪紅丸

甚者宜天痛不止熱未清也。宜清中湯曰悸勞役則頭面赤而下重自

煩發熱脉弦臍上跳心中痛由心傷也。宜辰砂妙香散曰血脉必

澹壯盛人宜下。宜代抵當湯虛弱人須補而帶行。宜四物湯加桃仁穿山甲肉桂心蓬木降

香飲下作呃亦須行之。宜手拈散曰臣必面色青黃有白斑唇紅能食

或食後即痛或痛後即能食或嘔噦涎沫或吐青水凡吐水者臣

痛不吐水冷心痛也。臣心痛小兒多有之。上半月臣頭向上易治

之隨服妙功。曰症鬼症也。必心痛神昏卒倒昏憤妄言或口噤由

卒感惡也。宜蘇合丸此所謂九種心疼也。顧經言心痛未有不兼五臟

者。經曰厥心痛與背相控善慙如從後觸其心僂僂者腎心痛也。

宜神保元神腹脹胸滿胃滯當心痛上支兩脇咽膈不通胃心痛

也。宜草薏菴丸如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也。宜詞子散

散色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也。宜金鈴子散內外邪犯心

之包絡或他臟之邪犯心之支脉故心亦痛此厥心痛也謂之厥

者諸痛皆肝腎二經氣逆上冲又痛極則發厥也但分寒熱二種

手足厥逆冷汗尿清不渴氣微力弱而心痛則寒厥心痛也。宜木

身熱足冷煩躁脉洪大而心痛甚則熱厥心痛也宜金鈴子散清鬱散經又

曰陽明有餘上歸于心滑則病心疝心痛引少腹滿上下無定處

溲便難者取足厥陰肝心痛腹脹畜然大便不利取足太陰脾心

痛短氣不足以息取手太陰肺心痛引背不得息取足少陰腎以

上皆他臟之病干之而作痛者非心本經自病也治法當兼用各

臟藥經又曰邪在心則病心痛喜悲時眩仆此則包絡受邪痛在

腑不在臟者也經又曰手少陽三焦脉動則病噎乾心痛渴而欲

飲此則別絡受邪痛在絡不在經者也二者之痛皆因怵惕思慮

傷神涸血而然宜補心湯而亦有卒心痛脉洪數者宜黃連一兩煎湯頓服如按

之痛減則為虛宜酸收不應辛散宜歸脾湯加乾姜肉桂菖蒲有心膈大痛嘔

逆發厥藥不納者趁勢以鵝毛探吐痰盡而痛自愈內服藥宜南星安

湯中有虻虫噉心者痛有休止或吐虻虫動則惡心嘔吐宜烏梅丸蕪荑散

心痛之不同如此總之七情之由作心痛食積痰飲瘀血作胃痛
二語正是分明曷言乎心痛由七情也經云喜則氣散怒則氣上
憂則氣沉思則氣結悲則氣消恐則氣下驚則氣亂除喜之氣能
散外餘皆足令心氣鬱結而為痛也然心痛亦有虛是按之痛止
者虛也宜參木散按之痛反甚者是也宜梔黃丸凡痛多用溫散之藥獨不
可用補氣血藥以氣旺不通則痛愈甚也

脉法 脉訣曰心腹痛脉沉細宜浮大弦長命必殂又曰沉弦
細動皆是痛症心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然 丹
溪曰心痛左手脉數熱多也脉濇有死血也右手脉緊是痰
積也脉大必是久病也兩手脉堅寔不大便可下之痛甚者脉
必伏 正傳曰心脉微急為痛微大為心痺引背痛短而數或
濇者心痛

心痛症治 入門曰心痛引背。冬屬風冷。心痛嘔瀉。難以俛仰。冬屬熱。丹溪曰。凡心胃痛。須分新久。若明知身受寒冷。口吃寒物而得者。于初得之時。當與溫散。如桂枝四七湯之類。或溫利之。如九痛元之類。若得之稍久。則成鬱。鬱久必生熱。熱久必生火。若溫散溫利。則助火添邪。由是方中。多以山梔為熱藥之嚮導。則邪易除。正易復。痛易安。又曰。心胃痛。須用劫藥。痛乃止。如倉卒散。山梔四十九枚。連皮炒。大附子一個。炮去皮。臍共為粗末。每三錢。水一盞。酒半盞。煎七分。入鹽少許。服。加川芎一錢。尤妙。能治氣自腰腹間。掣急疼痛。不可屈伸。痛不可忍。自汗如洗。手足冷而垂死者。又如愈痛散。五靈脂。延胡索。蓬朮。良姜。當歸。等分。共為末。每二錢。醋湯調服。能治急心痛。胃疼。又曰。心胃痛。用山梔劫藥止之。又復發。前藥必不效。可加元明粉一錢。服。

之即止矣。

飲食禁忌 丹溪曰：心胃痛日數多，雖不吃飯不死。若痛止便吃物，即復發，必須三五日服藥，方可吃物。

導引 保生秘要曰：于足三里指之九九，擦亦九九，運行後功，痛氣降而愈。

運功 保生秘要曰：行歸元逐痛處，流行胃火，自然發散。此導

功二法不但治心痛兼治胃口痛

心癱心熱病也。經曰：諸痛癢瘡瘍皆屬心火。其發于他經者，且莫不由于心火。况本經積熱而即發于本經部位者乎？其所以致熱之故，則必其平日好飲酒，或嗜食辛辣熱物，以致日久凝聚而生此症也。宜先用涼血飲次服加味十奇散

心癱症治 靈樞曰：巨闕穴隱隱而痛者，心疽，上肉微起者，心

癰也。入門曰心癰者。于胸乳間生蜂窠癰發。靈樞經所謂一
 名井疽。狀如豆大。三四日起。不早治。則入于腹。七日死。急用疏
 導心火之藥。宜用清心丸。清心散。內固清心散。瀉心湯。瘍科
 選粹曰。心癰發胸乳間者。名井疽。若在鳩尾者。最緊要。係心熱
 極盛者。當導心火。緩則不救。小便瀉者。清心散。或涼膈散。去硝
 黃。加白芷。花粉。木通。瞿麥。大便秘者。內固清心散。涼膈散。去硝
 黃。加白芷。花粉。生地。發于膈。名甘疽。其色青。狀如穀。寔瓜。蔓。常苦
 寒熱。不急治。十日死。死後出膿。

治心疾諸藥要品及方五

心寔宜降火清熱

黃連 犀角

石膏 滑石

甘草 竹葉

麥冬 燈心

牡丹皮 童便

大便結燥。須大黃。芒硝。發狂。詰語。亦如之。

心虛宜益氣補血

人參 生黃

炙草 藥仁

圓眼 丹參

茯神 遠志

金石斛 五味子

鹿茸 丹砂 炒鹽 琥珀 柏子仁
龍齒 金箔 牛黃 麥冬 代精石

桔梗 竹瀝 貝母 鬱金 陳胆星
鈞鈞 白芍 黃連 元參 北沙參

元參 竹茹 當歸 黃芪 枸杞子
黃芩 黃柏 牡蠣 天冬 紫石英

錢氏安神丸

補虛 水飛 砂一兩 麥冬 牙硝 寒水
石 茯苓 山藥 甘草 各五錢 冰片 二分
半 蜜丸 每兩作三十九丸 每丸砂糖水化下

醒心散

心虛熱 人參 麥冬 遠志 茯神 五味
子 石菖蒲 生地 等分水煎

瀉心湯

瀉心熱 黃連 不拘多少 爲極細末 每服二分
半 或五分 或一錢 溫水調下

導赤散

心熱 生地 木通 甘草 各一錢 竹葉七
片 此雖治心熱 寔小腸之藥也

十味導赤散

寔熱 黃連 黃芩 麥冬 半夏 茯苓
赤芍 木通 生地 甘草 地骨皮 各用五
分 姜五片 此治心臟寔熱 一切口舌生瘡
驚悸煩渴諸症

附載仲景大法及分別標本方藥

有餘爲熱

氣 牛黃 黃連 冰片 天竺黃
血 硃砂 生地 黃柏

心病方

不足為寒

氣血

人參 地黃

茯苓 當歸

乾姜 肉桂

苜蓿

心盛則生熱

子能令母寔 寔則瀉其子

心虛熱收內

母能令子虛 虛則補其母

逆則多盛

大黃 川黃連

大則病進

熟地 黃硃砂

心悸

汗多 桂枝 陰虛 茯苓

少陰 柴胡 雜病 硃砂

痞悶

虛半夏 寔枳寔 寒白木 乾姜 熱大黃 黃連

濕茯苓 澤瀉 燥木瓜 芍藥

痞

心下有水 枳寔 澤瀉 白木 心下無水 木瓜 芍藥 旋覆花

下之心下痞

雜病 半夏 芍藥 傷寒 甘草 瀉心湯

下之脇下痛

虛芍藥 寔牡蠣 柴胡 柴胡

一法火鬱則發之謂汗之令疏散也

標

黃連 于能令母寔寔則瀉其子

本地黃 生者自病丁與丙同治

治伏梁方二

伏梁丸

總治 黃連一兩半 人參 厚朴各五錢
黃芩 桂枝 丹參 茯苓各一錢 乾姜
葛滿 巴霜 川烏各五分 紅豆蔻二分
蜜丸 服法詳息賁症

增損五積丸

通治 黃連 厚朴 川烏 乾姜 人參
茯苓 藥品分量加減製法俱詳息賁症

治心痛方三十九

必應湯

類心痛 延胡索 香附 艾灰 歸身 砂
仁 姜

青皮丸

食痛 青皮 山查 神曲 麥芽 草果

小胃丹

飲痛 芫花 甘遂 大戟 大黃 黃柏
白木煎膏丸 藤子大臨臥湯下一錢欲利空心
服之

胃苓湯

又 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 白木 茯苓
苓 猪苓 澤瀉 肉桂 姜 棗
寒痛 白朮 附子 甘草

木附湯

歸脾湯

虛弱 人參 黃芪 當歸 白朮 茯神 棗仁 遠志 桂圓 木香 甘草 姜 棗

金鈴子散

熱痛 金鈴子 延胡索 痛止當與香砂枳 木丸

剪經丸

又 蓬莪朮 京三稜 雄黃 木香 尖枳 椰 貫仲 乾漆 陳皮 大黃 糊丸每五 十九丸米湯下

清中湯

大熱 黃連 山梔 陳皮 茯苓 半夏 甘草 草豆蔻 姜

加味歸脾湯

悸痛 人參 黃芪 當歸 白朮 茯神 酸仁 遠志 桂圓 木香 甘草 姜 棗 加菖蒲 肉桂

代抵當湯

血痛

虛弱 川芎 當歸 白芍 生地

四物湯

手拈散

呢痛 延胡索 五靈脂 草果 沒藥 等 分爲末每三錢熱酒下

妙應丸

虫痛 檳榔 一兩二錢 黑牽牛頭末三錢 大黃 雷丸 錫灰 蕪夷 木香 使君子 肉各一錢 葱白煎濃湯露一宿和丸粟米大 每四錢五更葱湯下如取寸白唾以石榴根皮

煎湯下小兒服一錢或五分天明取下虫物此
丸不損真氣有虫則下虫有積即下積有氣即
消氣一服見效

蘇合丸

疳漏 白朮 犀角 訶子 硃砂 華撥
香附 木香 檀香 沉香 丁香 麝香
安息香 薰陸香 蘇合香油

補心湯

絡痛 人參 當歸 茯神 遠志 地黃
甘草 柏子仁

南星安中丸

烏梅丸

蛔痛 烏梅十五个 黃連七錢半 當歸
川椒 細辛 附子 人參 肉桂 黃柏各
三錢 醋浸烏梅取肉打和為丸米飲下一二
十九丸

蕪夷散

又 蕪夷 雷丸各五錢 乾漆一錢 共為
末 溫水調下二錢小兒服五分
因飲

三花神佑丸

五積散

因寒

桂枝四七湯

因寒 桂枝 半夏各二錢 酒白芍一錢半
茯苓 厚朴 枳壳各七分 人參 紫蘇
葉 炙甘草各五分 姜三 棗二

九痛元

因冷 附子三兩 吳萸 人參 乾姜炮
巴霜各一兩 狼毒五錢 蜜丸 梧子大溫酒
下三五丸

神效散

又 木香 青皮 陳皮 麥芽 枳壳 三
稜 蓬朮 神曲 肉桂 白芷 白芍 甘
草 延胡索 補骨脂各七分 華澄茄 丁
香各三分 姜三 棗二

辰砂妙香散

悸痛 黃芪 山藥 茯苓 茯神 姜遠志
各一兩 人參 桔梗 甘草各五錢 辰砂
三錢 木香二錢半 麝香一錢 每末二錢
蓮肉湯下

加味四七湯

又 半夏二錢 赤苓 厚朴各錢二分 茯
神 蘇葉各八分 姜遠志 炙甘草各五分
姜三 棗二 石菖半寸

大承氣湯

寔熱

神保元

腎心痛 全蝎七個 巴霜十粒 木香 胡
椒各二錢半 硃砂錢半爲衣 蒸餅丸 姜湯

神聖復氣湯

又 先用新水浸 再用新水浸 酒連 酒生地 枳壳
 俱用新水浸 再用新水浸 水浸川芎 葛荆子
 細辛以上七味各三分 又羌活 柴胡各一
 錢 藜蘆各八分 半夏 升麻各七
 分 當歸六分 郁李仁 防風 人參各五
 分 附子 炮姜各三分 白葵花三朶去心
 碎 水五盞煎至二盞入黃芪 草薹各一錢
 橘紅五分 煎至一盞乃入前浸兩藥連水
 傾入煎至一盞去渣熱服

參朮散

因慮 人參 白朮 炮姜 白豆蔻 縮砂
 仁 丁香 陳皮 甘草各一錢 姜三片
 加炒蛙粉二錢尤妙

梔萸丸

氣寔 山梔一兩半 吳萸 香附各二錢半
 蒸餅丸 生姜生地煎湯下二三十丸
 胃心痛 枳寔二兩 草薹煨 白朮各一兩
 麥芽 神曲 半夏各五錢 乾姜 青皮
 陳皮各二錢 炒鹽五分 蒸餅丸白湯下

草豆蔻丸

清熱解鬱湯

又 山梔一錢半 枳壳 川芎 香附各一
 錢 炒黃連 蒼朮各七分 陳皮 姜炭
 心痛方 心癢方

訶子散

炙草各五分 姜三片煎服戒飲食半日
服即止 脾心痛 炮訶子 厚朴 炮姜 草果 陳
皮 炒良姜 茯苓 神曲 麥芽 炙草
等分爲末每三錢入鹽少許痛時煎服

復元通氣散

又白丑頭末二兩 穿山甲炙 炒茴香各
一兩五錢 去白陳皮 延胡索 炙草各一
兩 木香五錢 共爲末每二錢姜湯下

清鬱散

厥心痛 半夏 陳皮 蒼朮 茯苓 便香
附 神曲 姜黃連 姜梔子各一錢 川芎
六分 姜炭五分 炙草三分 姜三片

倉卒散

劫藥 黑山梔四十九个 大附子一个炮
爲末每三錢水酒鹽少許煎服

愈痛散

又五靈脂 延胡索 蓬朮 炒良姜 當
歸 等分爲末每二錢醋湯調服

心頭痛方

總治 歌曰三个烏梅三个棗七粒杏仁一處
搗射香一粒用酒煎永不心疼直到老 烏梅
棗子俱去核杏仁泡去皮尖射香如小菜豆許
共搗如泥黃酒一杯煎兩沸溫服正痛時服之
婦人尤神效當時即止

治心癱方七

涼血飲

總治 木通 瞿麥 荆芥 薄荷 白芷
花粉 赤芍 麥冬 生地 山梔 連喬

車前 甘草各八分 加燈心竹葉 一名引
兵先鋒能退潮止渴解熱令毒內消

加味十奇散

又 人參 黃芪 當歸 肉桂 川芎 白
正 防風 桔梗 厚朴 甘草 乳香 沒

藥 共為末每三錢溫酒調服不飲酒麥冬湯
下 此即十宣散加乳香沒藥也一名固壘元

帥不論已成未成服之內消年衰氣弱者尤宜

清心丸

又 黃連一兩 茯神 赤苓各五錢 麥冬
米湯下 諸痛痒瘡瘍皆屬心火此藥主之

清心散

又 遠志 赤苓 赤芍 生地 麥冬 知
母 甘草各一錢 姜三 棗二 加黃連尤效

瀉心湯

又 大黃錢半 黃連 黃芩 山梔 漏蘆
澤蘭 連喬 蘇木各七分

內固清心散

又 白豆蔻 人參 硃砂 赤苓 雄黃
萊豆 朴硝 甘草 皂角各一錢 冰片

麝香各一分 共為末每一錢蜜水調下

涼膈散

又 連喬 山梔 大黃 薄荷 黃芩各七
分 甘草一錢八分 朴硝四分 竹葉十片

怔忡源流 甲 傑

沈金鰲撰

怔忡。心血不足病也。人所主者心。心所主者血。心血消亡。神氣失

守。則心中空虛。怏怏動搖。不得安甯。無時不作。名曰怔忡。或由陽

氣內虛。宜人參黃芪白朮炙甘草茯神或由陰血內耗。宜人參麥冬當歸地黃圓眼或由水飲

停於心下。水氣乘心。侮其所勝。心畏水不自安。宜茯苓茯神白朮半夏橘紅或

急急富貴。戚戚貧賤。或事故煩冗。用心太勞。甚至一經思慮。便動

皆當以養心血。調心氣。清熱豁痰為主。宜酌用清鎮湯如心火熾。又須安

神。宜安神丸或由汗吐下後。正氣孱弱。宜人參黃芪白朮白芍或由榮衛俱涸。脉

來結代。而心惕不甯。宜養心湯或由虛弱怔忡而卧不安。宜棗仁湯或思慮

多而怔忡。兼不寐。便濁。宜養榮湯或心虛怔忡而兼自汗。宜參歸腰子或由

痰為火動。而時作時止。宜二陳湯或由憂愁悲苦。致心虛而動。宜歸脾湯或

由氣鬱不宣。而致心動。宜加味四七湯或陰火上冲。怔忡不已。甚

至頭暈眼花齒髮脫落或見異物或腹中作聲急應滋陰降火加

養心之品宜四物湯加知母黃柏如久服降火藥不愈為無根失守之火宜

味或由所求不遂或過縱自悔吁嗟夜語真若有失宜溫胆湯加

硃砂為衣以上皆怔忡所致之由也若心澹澹動此係包絡所生

病宜鎮蓋心為君火包絡為相火火陽主動君火之下陰精承之

相火之下水氣承之則為生氣而動得其正若之所承則煩熱而

為心動法當補其不足以安神氣未瘥則求其屬以衰之若由于

痰飲者當用逐水消飲之劑宜二陳湯况乎各臟有痰皆能與包

絡之火合動而為怔忡隨所犯而補瀉之更須調乎包絡若各臟

移熱于心以致包絡火動者治亦如之然則怔忡固由于虛所以

致此怔忡之症則各有異亦安可不察之哉

脉法 靈樞曰手厥陰之脉甚動則心中澹澹大動

怔忡形症 內經曰胆病者亦心中澹澹如人將捕又曰太陽
司天寒淫所勝則病心澹澹大動寒傷心主也註曰澹澹水搖
貌此屬水病 直指曰心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水
既上升心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是爲怔忡又曰
怔忡因驚悸久而成也 綱目曰怔忡惕惕然心動而不寧無
時而作者是也又曰心澹澹動者因痰動也謂非驚怕而心自
動也 資生曰內經謂胃絡名虛里貫膈絡肺出左乳下其動
應衣虛而有痰則動更須臾發一陣熱者是也

怔忡治法 入門曰怔忡因驚悸久而成也痰在下火在上參
胡溫胆湯加黃連梔子當歸貝母氣鬱者金箔鎮心丸停飲者
二陳湯加茯苓檳榔沉香麥冬 直指曰心下有水氣怔忡宜
五苓散 醫鑑曰怔忡亦曰怔忡與驚悸同看宜益榮湯姜朮

湯四物安神湯朱雀丸加味甯神丸天王補心丹

卑慄心血不足病也與怔忡病一類其症胸中痞塞不能飲食如

痴如醉心中常有所歉愛居暗室或倚門後見人即驚避無地每

病至數年不得以癩症治之也宜天王補心丹人參養榮湯古菴心腎丸

治怔忡方二十三

清鎮湯

勞心 茯神 棗仁 遠志 菖蒲 石蓮
當歸 生地 貝母 麥冬 柏子仁 如犀
角 珠砂 西珀 龍齒 牛黃 麝香 等病深者方可酌
加之不得概用也

安神丸

心火 黃連 六錢 珠砂 五錢 生地 二錢半
炙甘草 當歸 各二錢
脉結代 黃芪 當歸 茯神 茯苓 川芎
半夏 各錢半 遠志 棗仁 人參 五味

養心湯

子 柏子仁 各一錢 炙甘草 五分 如覺胸
中有聲便是停水加赤苓 枳櫛

棗仁湯

虛弱 黃芪 棗仁 茯苓 遠志 蓮子 各
錢二分 人參 當歸 茯神 各一錢 炙甘
草 陳皮 各五分

養榮湯

思慮 當歸 小草 黃芪 棗仁 茯神
木香 人參 白芍 麥冬 炙甘草 柏子
仁各一錢

參歸腰子

虛弱 人參 歸身各五錢 猪腰一隻去筋
膜細切全煎并腰子藥汁食之
痰火 茯苓 陳皮 半夏 甘草

二陳湯

芎夏湯

心動

加味四七湯

氣鬱 半夏二錢 赤苓 厚朴各錢二分
蘇葉 茯神各八分 姜遠志 炙甘草各五
分 石菖蒲半寸 姜七片 棗二枚

歸脾湯

憂愁 人參 黃芪 當歸 白朮 茯神
遠志 棗仁 龍眼 木香 炙草 姜 棗
陰火 川芎 當歸 白芍 生地

四物湯

八味丸

游火 熟地 山萸 山藥 丹皮 澤瀉
茯苓 肉桂 附子

溫膽湯

包絡動 人參 茯神 遠志 硃砂 金石
斛 生地 麥冬 棗仁 甘草 五味子
柏子仁

參胡温胆湯

痰火 香附二錢四分 橘紅錢二分 半夏
枳實 竹茹各八分 人參 茯苓 柴胡
麥冬 桔梗各六分 甘草四分 姜三
棗二 此即加味温胆湯能治心胆虛怯觸事
易驚涎與氣搏變生諸症

金箔鎮心丸

氣鬱 胆星一兩 硃砂 西珀 天竺黃各
五錢 牛黃 雄黃 真珠各二錢 麝香五
分 密丸每兩作三十九金箔為衣薄荷湯下
一丸 兼治癩癩驚悸怔忡一切痰火之疾
水氣 肉桂 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉

五苓散

益榮湯

總治 黃芪 當歸 小草 棗仁 麥冬
茯神 白芍 柏子仁 紫石英各一兩 木
香 人參 甘草各五錢 右到每七錢加姜
五棗二煎服 此方專治思慮過度耗傷心血
恍惚怔忡一切之症

姜朮湯

又 白姜 生白朮 赤苓 半夏曲各五錢
桂皮 甘草各二錢 右到每五錢加姜三
棗二煎服 此治虛人停飲怔忡

四物安神湯

又 當歸 白芍 生地 熟地 人參 白
朮 茯神 棗仁 黃連炒 柏子仁炒 麥

冬竹茹各七分 棗二枚 炒米一撮
梅二个煎 另研辰砂五分冲服 此治心中
無血如魚無水怔忡跳動之症

朱雀丸

又茯神二兩 沉香五錢 蒸餅丸辰砂五錢
錢為衣人參湯下五十九 此治心神不定恍惚健忘火不下降時復振跳之疾

加味寧神丸

又生地兩半 當歸 白芍 茯神 麥冬 陳皮 貝母各一兩 姜遠志 川芎各七錢 棗仁 黃連 甘草各五錢 蜜丸辰砂為衣棗湯下五七十九 此治心血不足驚悸怔忡健忘恍惚一切痰火之疾

天王補心丹

又酒生地四兩 酒黃連二兩 石菖蒲一兩 人參 酒當歸 天冬 麥冬 五味子 棗仁 柏子仁 元參 丹參 茯神 桔梗 遠志各五錢 蜜丸辰砂為衣臨卧竹葉燈心湯下 此能寧心保神令人不忘除怔忡定驚悸養育心神

治卑慄方三

人參養榮湯

總治 白芍錢半 人參 黃芪 陳皮 肉桂 當歸 白朮 炙甘草各一錢 熟地 鹿茸 貝母 茯苓 各一錢 三七

五味子 茯苓各八分 遠志五分 姜三

天王補心丹 又 見上

古菴心腎丸 又 熟地 生地 山藥 茯神各三兩 當

歸 澤瀉 監酒炒黃柏各一兩半 山萸 杞子 醋炙龜板 牛膝 黃連 丹皮 酥 炙鹿茸各二兩 生甘草五錢 蜜九煉砂一 兩為衣空心鹽湯或溫酒下 此治勞損心腎 虛而午熱驚悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛 脚痿之疾久服烏鬚黑髮令人有子

驚悸悲恐喜怒憂思源流

沈金鰲撰

驚者心與肝胃病也。內經言驚屬之肝胃。但心氣強者雖有危險觸之亦不為動。惟心氣先虛故觸而易驚也。然則因所觸而發為驚者雖屬肝胃受其驚而輒動者心也。故驚之為病仍不離乎心。其由乎肝者何也。肝屬木。屬風。風木多震動故病驚駭也。其由乎胃者何也。胃多氣多血。血氣壅則易熱。熱故惡火而易驚。且胃氣厥則為憂懼。故惡人之煩擾而驚。陽明屬土。土畏木。故聞木聲而驚也。大抵驚之因多由於外。或耳聞大聲。或目見異物。遇險臨危。當其外有所觸。心忽一虛。神氣失守。神去則舍空。舍空則液與痰涎着于包絡之間。宜控涎丹加珠砂遠志多致目睛不轉。不能言。短氣自汗。體倦坐卧不安。多異夢。忽驚覺多魘。宜溫胆湯獨活湯琥珀養心丹與悸恐不同。若因大驚而病者。脉必動如豆粒。寸脉止而復來曰動脉而無頭尾。急當鎮

大
卷
七
上

定之。宜黃連安神丸有由腎虛而驚者。宜人參黃芪當歸白朮元參陳皮黃柏有由胆虛而

驚者。宜人參枳壳肉桂五味子棗仁熟地杞子柏子仁有由肝胆俱虛百藥不效者。須補

腎。宜酒化鹿角膠空腹下五錢極效古人謂肝無虛不可補。補腎正補肝也。有被

物所驚心跳不寧者。宜秘方有心氣不足神不定而驚者。宜妙香散有肝

虛受風卧若驚狀者。宜珍珠母丸有血虛而驚者。宜硃砂安神丸有由痰盛而

驚者。宜加味定志丸有思慮過度者。宜清心補血湯有氣血俱虛者。宜養心湯皆當求

其端而治之而驚始可安矣。

脈法 脈訣曰心中驚悸脈必結代 正傳曰寸口脈動而弱

動為驚弱為悸又曰肝脈動暴有所驚駭 得效曰驚則脈顛

顛者動也 入門曰驚傷胆則脈動

驚病形症 內經曰血并于陰氣并于陽故為驚狂 綱目曰

驚者心卒動而不寧也 三因曰因事有所大驚而成者名曰

心驚胆攝。病在心胆經。其脉必大動。丹溪曰：驚悸者，有時而作。大概屬血虛與痰。瘦人多是血虛，肥人多是痰飲。時覺心跳者，亦是血虛。入門曰：驚悸因思慮過度及大驚恐而作。甚則心跳欲厥。又曰：驚悸當補血安神。宜靜神丹、寧志元。若氣鬱驚悸，宜艾感丹、加味四七湯。正傳曰：心虛而痰鬱，遇險臨危，觸事喪志，使人有惕惕之狀，是為驚悸。

悸者，心痺病也。非緣外有所觸，自然跳動不寧。其原由水衰火旺，故心胸躁動。宜天王補心丹或水停心下，心為火而惡水，故築築跳動不宜自安。宜茯苓飲子或汗吐下後，正氣虛而悸不得卧。宜温胆湯此皆悸病之由也。總而論之，要不外乎心傷火動，火鬱痰生。二語其為症狀。舌強恍惚，善悲。丹溪以血與痰槩之。虛宜天王補心丹可以識其端矣。

悸病形症 仲景曰心悸者水懼火也。惟腎欺心故為悸。傷寒飲水多必心下悸。又曰食少飲多水停心下甚者則悸。微者短氣。三因曰五飲停畜閉于中腕使人驚悸屬飲家。綱目曰

水飲為症必頭眩心悸

悲者心肝兩虛病也。凡人心氣虛神失所守肝虛又不能生之則志不能伸已無暢遂之致而金來乘木肺氣復與相并肺本主悲故遂生悲病也。所謂善悲者不必定有可悲之事心中只是快悒不快。雖遇可喜亦祇強為歡笑而已。宜加味溫胆湯安神補心湯

脈法 得效曰悲則脈結或云緊 入門曰悲傷心包則脈必緊。

悲病原由 內經曰肺在志為悲。又曰心虛則悲悲則憂。又曰精氣并于肺則悲。又曰悲則氣消。又曰肺主殺故其志為悲。

靈樞曰悲哀動中則傷魂又曰悲哀動中者竭絕而失生

恐者心腎肝胃病也。心藏神。神傷則心怯而恐。火傷水也。胃屬土。

腎屬水。土邪傷水則為恐。肝者腎之子。水強則胆壯。水衰則血虛。

故易恐而恐者。又腎之情志。故心肝胃三經皆有恐病。其原莫不

由于腎也。此則內經之旨也。故恐病由心者宜鎮其神。宜定志丸

琥珀犀角 恐病由胃者宜壯其氣。宜四君子湯倍茯苓 恐病由胆與肝者宜

養其陰。宜酸棗仁湯去黃芪蓮肉加山萸丹皮白芍 恐病由腎本經傷者宜壯其水。人

參散去肉桂加牛膝遠志

脉法 得效曰恐則脉沉 入門曰恐傷腎則脉必沉 脉經

曰人恐怖其脉何狀師曰脉形如循絲纍纍然其面白脫色也

又曰人愧者其脉何類師曰脉浮而面色乍白乍赤也

恐病原由 內經曰腎在志為恐又曰胃為恐註云胃熱則腎

氣微弱。故爲恐。又曰。精氣并于腎則恐。由心虛而腎氣并之。故爲恐。靈樞曰。足少陰之脈病。善恐。又曰。恐懼而不解。則傷精。又曰。恐者。神散蕩而不收。又曰。恐則氣下。註云上焦固禁。下焦氣還。故氣不行矣。子和曰。肝藏血。血不足則恐。綱目曰。恐與驚相似。然驚者爲自不知也。恐者爲自知也。蓋驚者聞響乃驚。恐者自知。如人將捕之狀。及不能獨自坐。不能獨自卧。或夜必用燈者是也。

喜者心。肺二經病也。凡人心有所樂。則動。動而其氣達于外。爲喜。其氣卽肺氣也。肺氣舒暢。喜迺以成。然是喜也。或觸乎事。或因乎境。爲情之正。中庸所謂喜怒哀樂發而皆中節。謂之和者是也。若過其節。則情蕩而不能收。心。肺二臟俱傷矣。二臟旣傷。而病于是作矣。

宜定志。凡加天冬。麥冬。

顧安可逞情怒志爲哉。

脉法 得效曰喜則脉散 入門曰喜傷心則脉虛

喜病原由 內經曰心在志爲喜又曰心寔則笑笑則喜蓋按

者邪氣寔于心也邪氣或痰或火是也又曰暴喜傷陽又曰喜怒傷氣又曰喜怒

不節寒暑過度生乃不固又曰喜則氣緩蓋喜則氣和志達榮

衛通利故氣緩矣 靈樞曰喜樂者神蕩散而不藏又曰喜樂

無極則傷魄魄爲肺神也

怒者肝膽病也怒本情之正惟發不中節則肝胆之氣橫逆而二

經遂傷且木盛尅土久必傷脾怒所以爲病也程子云因是人

可怒之事而怒之聖人之心本無怒如此用怒便是情之正便是

發而中節之和豈至成病今所謂怒者以肝胆屬木木性本直木

勢必伸稍有所鬱不能遂其直達之性不能順其上伸之勢因激

而成怒則此怒已非情之正已非中節之和卽其怒已是病况木

鬱則激。激則橫。橫則變生諸症。有不可意計測者矣。程子又云。治怒爲難。惟克己可以治怒。此聖賢治怒之法也。余亦云。治怒爲難。惟平肝可以治怒。此醫家治怒之法也。言肝而胆在其中。宜香甘散

脉法 得效曰怒則脉激 入門曰怒傷肝則脉必濡

怒病原由 內經曰肝在志爲怒 又曰暴怒傷陰 又曰大怒則

氣絕而血菀于上。菀鬱也使人薄厥 又曰血并于上氣并于下 心

煩惋善怒 又曰怒則氣逆甚則嘔血及殮泄矣 又曰胆爲怒

綱目曰怒在陰陽爲陰閉過而不得伸也

憂者肺與脾病也。肺居華蓋之頂。下通心肝之氣。心有所愁苦而不樂。則上薄乎肺而成憂。故憂爲肺病。肺與脾同稱太陰。同行氣以給衆臟。肺既成憂病。則閉結不解。氣固于內而不通。氣不通則大小便閉而傷脾。故憂又爲脾病。宜靜神丹歸脾湯

脉法 得效曰憂則脉濇 入門曰憂傷肺則脉必濇

憂病原由 內經曰肺在志為憂又曰憂則氣沉 靈樞曰愁

憂不解則傷意意為脾神也又曰憂則隔塞否閉氣脉斷絕而

上下不通也

思者脾與心病也脾之神為意意者心之所發也由發而漸引焉

曰思則當其發屬在脾及其思屬在心故元晏先生曰思發于脾

而成于心也中庸曰有弗思思之弗得弗措論語曰君子有九思

孟子曰心之官則思是思固不可不用者然思之太過則流蕩失

節必至傷神神傷百病叢集矣其何以堪故或有勞心思慮損傷

精神致頭眩目昏心虛氣短驚悸煩熱者宜清心補血湯有思慮傷心致

心神不足而不能寐者宜養心湯有憂思過度令人惕然心跳動而不

自安者宜靜神丹有思慮太甚致心氣不足忽忽善忘恐怯不安夢寐

不祥者。宜定志丸有思慮太甚。心血耗散。竟至怔忡恍惚者。宜益榮湯有因

思勞傷心脾致健忘失事。言語顛倒如痴者。宜歸脾湯有思力太猛。心

神失守。致痰涎聚于心包。漸成痴癲者。宜加味茯苓湯凡此皆思之病也。

皆過用其思之病也。乃若過用其悲憂恐懼。病亦有類于此者。治

法大約可以相參。

脉法 得效曰。思則脉沉。一云結。入門曰。思傷脾。則脉必結。

又曰。凡七情之脉。惟氣口緊盛而已。細分之。乃有如此等項之

不同也。

思病原由 內經曰。脾在志為思。又曰。思則氣結。註云。繫心不

散。故氣亦停留而結也。靈樞曰。因志而存。變謂之思。因思而

遠慕。謂之慮。又曰。怵惕思慮則傷神。神蕩則恐懼流淫而不止

也。

香甘散

總治 香附 甘草各一兩 共為末每三錢白湯下

治憂方二

靜神丹

總治 酒當歸 酒生地 姜遠志 茯神各五錢 茵蒲 黃連各二錢半 硃砂二錢 牛黃一錢 猪心血丸 黍米 大金箔十五片為衣 燈心湯下五十九
又 當歸 龍眼 棗仁 遠志 人參 黃芪 茯神 白朮各一錢 木香五分 甘草三分 姜五 棗二

歸脾湯

治思方七

清心補血湯

損傷 人參一錢二分 當歸 白芍 茯神 棗仁 麥冬各一錢 川芎 生地 黑山 梔 炙甘草 陳皮各五分 五味子十五粒 此方一名補血湯又各當歸飲

養心湯

不寐 茯苓 茯神 當歸 生地各一錢 蜜黃芪 姜遠志各八分 柏子仁 川芎 棗仁各七分 半夏麴六分 人參五分 炙甘草 肉桂各三分 五味子十四粒 姜三片 怔忡加檳榔赤苓

靜神丹

心跳 酒當歸 酒生地 姜遠志 茯神各
五錢 菖蒲 黃連各二錢半 辰砂二錢

牛黃一錢 猪心血丸 黍米 大金箔十五片 爲
衣 燈心湯下五十九

定志丸

恐怯 人參 茯苓 茯神各三兩 菖蒲
姜遠志各二兩 硃砂一兩半 爲衣 蜜丸

益榮湯

恍惚 黃芪 當歸 小草 棗仁 柏子仁
麥冬 茯神 白芍 紫石英各一兩 木香
人參 甘草各五錢 每用末七錢加姜五

棗二煎服

歸脾湯

傷心脾 當歸 龍眼 棗仁 遠志 人參
白朮 黃芪 茯神各一錢 木香五分

甘草三分 姜五 棗二

加味茯苓湯

痰聚 人參 半夏 陳皮各一錢半 益智
仁 茯苓 香附各一錢 甘草五分 姜三

片 烏梅一个

煩躁健忘源流

沈金鰲撰

煩躁。心經熱火病也。內熱心煩曰煩。故煩者。但心中鬱煩也。外熱身躁曰躁。故躁者。并身外熱躁也。內熱屬有根之火。其原本于熱。凡但煩不躁。及先煩後躁者。皆易治。外熱屬無根之火。其原本于寒。凡但躁不煩。及先躁後煩者。皆難治。傷寒亦有煩躁症。其所主屬肺腎二經。與此心經主病者不同。故傷寒之煩氣也。火入于肺也。傷寒之躁血也。火入于腎也。若諸虛煩熱。又與傷寒相似。但不惡寒。身頭皆不痛。脉不緊。數耳。切不可汗下。誤攻必害。茲即心經所主煩躁。而歷言之。有身不熱。頭昏口乾不寐者。是心虛煩。宜參竹葉湯。有煩熱誤汗。熱益甚。致嘔者。宜陳皮湯。有內熱頭痛。氣短心悶亂者。宜竹茹湯。有煩熱。睡卧不寧者。宜遠志湯。有憂思成虛煩勞病者。宜小蓀湯。有腎虛心躁。煩下部瘦弱。小便痛者。宜八味丸。其不得一例視之也。明矣。若

夫傷寒煩躁另詳本條。

煩躁原由 內經曰夏脉者心也。不及則令人煩心。又曰肝虛

腎虛脾虛皆令人體重煩冤。

健忘。心腎不交病也。心不下交于腎。則濁火亂其神明。腎不上交

于心。則精氣伏而不用。火居上。則因而為痰。水居下。則因而生躁。

故惟補腎而使之時上。養心而使之善下。則神氣清明。志意常治。

而自不健忘矣。其為症可枚舉也。或思慮過度而病在心脾。宜引

舍丹歸脾湯 或素多痰飲。宜茯苓湯 或痰迷心竅。言語如痴而多忘。宜導痰湯送下

壽星丸 或精神短少。宜人參養榮湯 或上盛下虛。宜養心湯 或上虛下盛。宜龍眼湯 或

心火不降。腎水不升。神志不寧。宜生龍丸 或勤政勞心。讀書刻苦。宜安神定

志丸 或稟賦陰魄不足。神志虛擾。宜定志丸 或年老神衰而善忘。

宜加減固本丸 健忘之故。約畧盡矣。而世俗相傳有治健忘秘法。用菖蒲

遠志等分爲末。戊子日服二錢。令人不忘。又一法。擇丁酉日。密自至市買遠志。着巾角中。爲末服之。勿使人知。能不忘。未知何如。姑記以備採擇。

健忘原由症治。靈樞曰。上氣不足。下氣有餘。腸胃寔而心肺虛。虛則榮衛留于下。久之不以時上。故易忘也。又曰。腎盛而不止。則傷志。志傷則漸忘其前言。內經曰。血并于下。氣并于上。亂而善忘。丹溪曰。健忘。精神短少者多。亦有痰者。入門曰。怔忡久。則健忘。由心脾血少。神虧也。醫鑑曰。健忘者。陡然而忘其事。盡心力。思量不來也。主心脾二經。治法必先養心血。理脾土。以甯神定志。藥調理之。

治煩躁方六

人參竹葉湯

心虛

竹葉

人參

甘草

熟半夏

麥門

冬石膏

梗米

或去石膏

加茯苓

淮

小麥

心

健忘

煩躁方

卷六

二十七

亦可

陳皮湯

調酒 陳皮 甘草 人參 竹茹

竹茹湯

內熱 茯苓 麥冬 小麥 炙甘草 人參 熟半

遠志湯

煩熱 遠志 黃芪 當歸 麥冬 人參 金石斛 茯苓 知母 扶神 各七分 甘草五分 甚者加

小草湯

憂思 小草 黃芪 當歸 麥冬 金石斛 各一錢 人參 棗仁 各錢二分 炙甘草五

八味丸

腎虛 熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 肉桂 附子

治健忘方十三

引神歸舍丹

心脾 胆星二兩 珠砂一兩 附子七錢 猪心 血丸 黍米大每五十九 萱草 根湯下

歸脾湯

又 龍眼 人參 黃芪 當歸 白朮 茯苓 神 棗仁 遠志 木香 甘草 姜 棗

茯苓湯

痰飲 半夏 陳皮 茯苓 甘草 香附 益智仁 人參 各一錢 烏梅 一个 竹歷二

匙 姜汁二匙

導痰湯

痰迷 甘草

半夏 姜

南星

赤苓

枳寔

陳皮

壽星丸

又歸 當歸

姜遠志 生地

人參 白芍

黃芪 茯苓

白朮 陳皮

甘草 肉桂

加減固本丸

糊丸 老人

熟地 茯苓

天冬 各一兩

人參 石菖蒲

麥冬 遠志

炙甘 砂各五錢

此方兼治中風後善忘

人參養榮湯

神短 肉桂

白芍 一錢半

當歸 人參

黃芪 白朮

各一錢

陳皮 五味

熟地 茯苓 各八分

遠志 五分 姜

養心丹

上盛 木通

天冬 人參

麥冬 茯苓

牛膝 當歸

遠志

白朮 黃芪

龍眼湯

上虛 茯神

龍眼 黃芪

丹參 甘草

人參 升麻

遠志 柴胡

麥冬 沉香

一兩 茯神 四兩

人參 三

朱雀丸

心腎 兩

不交 蜜丸

沉香 一兩

茯神 四兩

人參 三

建忘片

卷六

二五

安神定志丸

勞心 人參 白朮 茯苓 茯神 菖蒲
遠志 麥冬 棗仁 牛黃 珠砂 龍眼散
膏加蜜丸日三服

定志丸

稟弱 人參 茯苓 茯神 各三兩 菖蒲
遠志 各二兩 蘇砂 一兩半 爲衣 蜜丸
又 鼈甲 龍骨 遠志 菖蒲

孔聖枕中丹

不寐多寐源流 夢麗

沈金鰲撰

不寐。心血虛而有熱病也。然王病之經雖專屬心。其寔五臟皆兼

及也。蓋由心血不足者。或神不守舍。故不寐。宜歸脾湯。琥珀養心丹。有由肝

虛而邪氣襲之者。必至魂不守舍。故卧則不寐。怒益不寐。以肝藏

魂。肝主怒也。宜珍珠母丸。有由真陰虧損。孤陽漂浮者。水虧火旺。火主

乎動。氣不得寧。故亦不寐。何者。肺為上竅。居陽分至高。腎為下竅。

居陰分最下。肺主氣。腎藏氣。旦則上浮于肺。而動。夜則下入于腎。

而靜。仙家所謂子藏母胎。母隱子宮。水中金也。若水虧火旺。肺金

畏火。不納腎水。陰陽俱動。故不寐。法宜清熱。宜六味丸。有由胃不

和者。胃之氣本下行。而寐亦從陰而主下。非若寤之從陽主上。今

胃氣上逐。則壅於肺。而息有音。不得從其陰降之道。故亦不寐。宜

紅甘草。金石斛。茯苓。冬。半夏。神曲。山楂。總之不寐之由。在肝則不快之狀。多見左。在肺

心 不寐 多寐

卷六 七

則不快之狀多見右。在心則不快之狀多見于上部之中。在胃則

不快之狀多見于胸腹之中。在腎則不快之狀多見于下部之中。

須分經而治。若因雜症所致。及傳經移邪。又當細究。試詳言之。勞

心之人多不寐。宜養心湯治之。年高之人多不寐。宜四君子湯。痰多之人

多不寐。宜溫胆湯。虛煩之人多不寐。宜酸棗仁湯。此其大較也。而亦有通宵

不寐者。宜安神湯。有寐即驚醒者。宜龍甲湯。有喘不得寐者。宜蘇子湯。

虛勞煩熱不寐者。宜棗仁湯。有肝虛驚悸不寐者。宜四君子湯。有大病

後虛煩不寐者。宜二陳湯加芡寔竹茹。有方卧即大聲鼾睡。少頃即醒。由於

心肺有火者。宜加味養心湯。有不能正偃。由於胃不調和者。宜和胃湯。兼肺氣

盛必瀉肺。宜白散。有勞心膽冷。夜卧不寐者。宜定志丸。加棗仁柏

或加味。溫明湯。有癲狂病發。火盛痰壅不寐者。宜辰砂散。有傷寒吐下後虛煩

不寐者。宜酸棗仁湯。有心膽俱怯。觸事易驚。夢多不祥。虛煩不寐者。宜

胆有矢志鬱抑痰涎沃心怔忡不寐者宜温胆湯加味温胆湯加味二陳湯有思慮

過度因脾主思致脾經受邪兩手脉緩經年累月不寐者宜益氣安神湯

有神氣不寧每卧則魂魄飛揚覺身在床而神魂離體驚悸多驚

通夕不寐者此各離魂症由肝藏魂肝虛邪襲魂無所歸故飛揚

離體也宜前後服珍珠母丸獨活湯不寐之症狀固如此其多矣蓋可忽乎哉

總之怔忡以下諸病都緣痰涎沃心心氣不足以至變生種種若

涼心太過則心火愈微痰涎愈盛漸至難治故必以理痰順氣養

心安神為第一義

不寐原由形症 靈樞曰壯者之氣血盛其肌肉潤氣道通榮

衛之行不失其常故晝精而夜瞑老者之氣血衰其肌肉枯氣

道澀五臟之氣相搏其榮氣衰少而衛氣內伏故晝不精而夜

不眠 內經曰人有卧而有所不安者藏有所傷及精有所倚

人不能知其病則卧不安。又曰：肺者藏之蓋也。肺氣盛則肺大不能偃卧。又曰：胃不和則卧不安。夫不得卧而喘也。是水氣之害也。鄭康成曰：口鼻之呼吸爲魂。耳目之聰明爲魄。以耳目與口鼻對言則口鼻爲陽。耳目爲陰。以耳目口鼻與藏府對言則耳目口鼻爲陽。藏府爲陰。故陽氣行陽分二十五度于身體之外。則耳目口鼻皆受陽氣。所以能知覺視聽動作而寤矣。陽氣行陰分二十五度于藏府之內。則耳目口鼻無陽氣運動。所以不能知覺而寐矣。回春曰：傷寒及雜病多睡者。陽虛陰盛也。無睡者。陰虛陽盛也。喜明者。屬陽元氣寔也。喜暗者。屬陰元氣虛也。睡向外者。屬陽元氣寔也。睡向壁者。屬陰元氣虛也。綱目曰：人卧則血歸于肝。今血不靜卧不歸肝。故驚悸而不得卧也。

多寐。心脾病也。一由心神昏濁。不能自主。一由心火虛衰。不能生

土而健運。其原有如此者。試言其症狀。體重或浮而多寐。濕勝也。

宜平胃散加防風白朮 食方已。即困倦欲卧。脾氣弱。不勝食氣也。俗名飯醉。

宜六君子湯加山查神曲麥芽 四肢怠惰而多寐。氣弱也。宜人參益氣湯 長夏懶怠。四肢

無力。坐定即寐。肺脾兩經之氣本弱。復為炎暑所逼也。宜清暑病益氣湯

後多眠。身猶灼熱。餘邪未清。正氣未復也。宜沈氏葳蕤湯 狐惑症。舌白齒

晦。面目乍白乍赤乍黑。變異無常。四肢沉重。默默多眠。大病後腸

胃空虛。三更求食。食入五臟。食其喉。則為惑。其聲啞。上唇必有瘡。

宜三黃瀉心湯 食其肛。則為狐。其咽乾。下唇必有瘡。宜雄黃銳散 此症殺人甚

急。當急治也。通用宜黃連犀角湯治惑桃仁湯 風溫陽脉浮滑。陰脉濡弱。發熱咽

乾口苦。微惡寒。閉目欲眠。少陰伏邪發出。更感太陽客邪也。宜黃芩湯

加桂枝石膏 亦有陰陽俱浮。具如前症。太陽受邪。悞發汗也。宜

則葳蕤湯加城

黃升麻湯去二麻。熱病得汗後。脉沉細。身冷喜卧。脉沉細昏沉不省。陽氣遏也。急與藥令四肢溫暖。不爾有熟睡死者。逆湯傷寒諸般多寐症。各詳本條。茲不贅。惟汗下後酣眠者。爲正氣已復。可勿藥也。醫者察其由。治其症。神而明之。其庶幾矣。

多寐原由形症 靈樞曰。足太陽有通項入于腦者。正屬目。本名曰眼系。在項中兩筋間入腦。乃別陰躋陽躋。陰陽相交。陽入陰。陰出陽。交于目內眥。陽氣盛則瞑目。陰氣盛則瞑目。又曰。腸胃大則衛氣行。留久皮膚濕。則分肉不解。其行遲。夫衛氣者。晝行於陽。夜行於陰。故陽氣盡則寐。陰氣盡則寤。故腸胃大則衛氣行。留久皮膚濕。分肉不解。則行遲。留于陰也。久其氣不精。則目瞑。故多卧矣。入門曰。衛氣不得入於陰。常留于陽。留于陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽躋盛。不得入于陰。故目不瞑。衛氣留于

陰不待行于陽。留于陰。則陰氣盛。陰氣盛。則陰蹻滿。不得入于

陽。故目閉。

夢者神與魂魄病也。心藏神。中虛不過徑寸。而神明居焉。故心者神明之舍。而神即精氣之所化成。靈樞經曰。兩精相薄。謂之神。隨神往來。謂之魂。並精出入。謂之魄。是神魂魄三者。固非判然不相屬者也。自人心多欲。神明外馳。因而氣散于內。血隨氣行。榮衛紛亂。魂魄不安。于是乎百疾作。疾作者。神離故也。故太上貴養神。其次纔養形。凡欲神之存乎舍也。凡欲神之存乎舍。而百疾不作也。若夫夢者。亦神不安之一驗耳。凡人形接則為事。神遇則為夢。神役乎物。則魂魄因而不安。魂魄不安。則飛揚妄行。合目而多夢。又况七情擾之。六淫感之。心氣一虛。隨感而應。諺云。日之所接。夜之所夢。洵有然也。

宜別離散益氣安神易

若古之真人。其寢不夢。非神存之故。

後寐

卷六

哉。夢而魘則更甚者。或由心寔則夢驚。寔奇怪之事而魘。宜靜或補血湯由心虛則夢恍惚幽昧之事而魘。宜清心甚有精神衰弱當其睡卧。魂魄外遊。竟為鬼邪侵迫而魘者。此名鬼魘。宜雄朱散另詳邪祟條中。甚矣夢非細故也。其如太上之養神而可哉。

五藏虛寔為夢。內經曰。肝氣虛則夢茵香生草。寔則夢伏樹下不敢起。心氣虛則夢救火陽物。寔則夢燔灼。脾氣虛則夢飲食不足。寔則夢築垣蓋屋。肺氣虛則夢見白物。見人斬血藉藉。寔則夢兵戰。腎氣虛則夢舟船溺人。寔則夢伏水中。若有所畏恐。

淫邪成夢。靈樞曰。陰氣盛則夢涉大水而恐懼。陽氣盛則夢大火而燔灼。陰陽俱盛則夢相殺。上盛則夢飛。下盛則夢墮。甚饑夢取。甚飽夢與。肝盛夢怒。肺盛夢哭泣。心盛夢善笑。恐畏。脾

盛夢歌樂身體不舉。腎盛夢腰脊兩解。不屬。又曰。厥氣客于心。則夢邱山烟火。客于肺。則夢飛揚。見金鐵奇物。客于肝。則夢山林樹木。客于脾。則夢邱陵大澤。壞屋風雨。客于腎。則夢臨淵沒居水中。客于膀胱。則夢遊行。客于胃。則夢飲食。客于大腸。則夢田野。客于小腸。則夢聚邑街衢。客于胆。則夢訟鬪自刳。客于陰器。則夢接內。客于項。則夢斬首。客于脛。則夢行走而不能前。及居深地。竈苑中。客于股肱。則夢禮節起拜。客于胞腹。則夢溲與便。

魂魄爲病。仲景曰。邪客使魂魄不安者。血氣少也。血氣少者。屬於心。心氣虛者。其人多畏。合目欲眠。夢遠行而精神離散。魂魄妄行。

治不寐方二十五

心

不寐方

卷六

三

歸脾湯

心 血少 龍眼 遠志 人參 黃芪 當歸 白朮 茯神

琥珀養心丹

又 琥珀 龍齒 菖蒲 遠志 人參 茯神 神 棗仁 當歸 柏子仁 黃連 生地 硃砂 牛黃 猪心血丸 黍米 大金箔 爲衣 煨

珍珠丸

肝 虛 珍珠 麝香 各三錢 熟地 當歸 各 兩半 棗仁 沉香 各五錢 冰片 一錢 虎睛 一

對 茯神 沉香 各五錢 冰片 一錢 虎睛 一 湯下 五十九丸 砂 金箔 爲衣 日午夜卧 各用 薄荷

六味丸

陰 虧 熟地 八兩 山藥 山萸 各四兩 丹 皮 茯苓 澤瀉 各三兩

養心湯

勞 心 當歸 黃芪 茯苓 茯神 川芎 半夏 遠志 炙草 人參 肉桂 五味 柏子仁 姜 棗

六君子湯

高 年 人參 茯苓 白朮 炙草 半夏 陳皮 半夏 茯苓 甘草 枳寔

温胆湯

痰 多 陳皮 半夏 茯苓 甘草 枳寔 竹茹 姜 棗

酸棗仁湯

虛 煩 石膏 二錢 半 人參 棗仁 各錢半 知母 赤苓 甘草 各一錢 肉桂 五分 姜

安卧如神湯

通宵 茯苓 茯神 白朮 山藥 寒水石
煨 棗仁各一錢 遠志 炙草各七分 砂五分 人參四分

鼈甲羌活湯

防風 鼈甲 羌活 獨活 川芎
人參 甘草 黃芪 牛膝 五味子 蔓荊子

蘇子竹茹湯

喘氣 蘇子 竹茹 橘皮 桔梗 甘草
煨 滑石 甘草

六一散

棗半湯

虛煩 棗仁二兩研極細入水二杯取汁半
夏二合煮爛入地黃汁一合更煮時時啣之
肝虛 人參 茯苓 白朮 甘草

四君子湯

病後 茯苓 陳皮 半夏 甘草

二陳湯

加味養心湯

心肺火 茯苓 茯神 黃芪 半夏 歸身
川芎各二錢半 炙甘草二錢 柏子仁
遠志 肉桂 人參 五味子 棗仁各一錢
二分 姜 棗 加羚羊角犀角俱磨冲

和胃湯

胃不和

瀉白散

肺盛 桑皮 地骨皮 黃芩 燈心 馬兜
鈴 山梔 黃連 桔梗 竹葉 大青 元
參 連香

定志丸

辰砂散

胆冷 人參 茯苓 茯神 各三兩 菖蒲
姜遠志 各二兩 硃砂 一兩 內半為衣 蜜丸
癲狂 上好辰砂 一兩 乳香 光瑩者 炒棗
仁 各五錢 共為細末 先量病人酒量 幾何置
病人 靜室中 以藥作一服 溫酒調下 飲至沉醉
但勿令吐 如不飲 隨量取醉 服訖 令臥 蓋好病
淺者 半日至一日 病深者 三日 熟睡 令家人 潛
伺之 勿驚 勿喚 待自醒 即神魄 定矣 萬一驚覺
不可復治

加味溫膽湯

失志 香附 二錢 四分 橘紅 一錢 二分 半
夏 竹茹 枳實 各八分 人參 茯苓 柴
胡 麥冬 桔梗 各六分 甘草 四分 姜 三
片 棗 二枚

加味二陳湯

益氣安神湯

傷脾 當歸 茯苓 各一錢 生地 麥冬
棗仁 遠志 人參 黃芪 胆星 竹葉 各
八分 甘草 黃連 各四分 姜 三 棗 二

真珠母丸

離魂 真珠母 七錢半 熟地 當歸 各一兩
半 人參 棗仁 柏子仁 犀角 扶神 各
一兩 沉香 龍齒 各五錢 蜜丸 砂為衣
每四五十九薄荷湯下日二服 此方真珠母
為君 龍齒佐之 真珠母入肝經為第一 龍齒與
新同類 龍齒虎睛人皆以為鎮心藥 不知龍齒
安魂 虎睛定魄 龍能變化 故魂遊而不定 虎能
專靜 故魄止而有守 魄不甯者 宜用虎睛 魂飛
揚者 宜用龍齒

獨活湯

又 獨活 羌活 人參 前胡 細辛 半
夏 沙參 茯苓 棗仁 甘草 五味子 各
七分 姜三片 烏梅一個

治多寐方十

平胃散

濕勝 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

六君子湯

脾弱 陳皮 人參 茯苓 白朮 炙草 半夏

人參益氣湯

氣弱 黃芪一錢半 人參 防風 升麻 各
七分 熟地六分 生地 白芍 各五分 生
草一分 炙甘草三分 五味子二十粒 肉
桂三分

心 不寐方 多寐方 夢方 卷六 尾

清暑益氣湯

暑倦 蜜炙黃芪一錢 人參六分 姜炒白
木 麻油炒蒼朮 醋炒升麻 陳皮
各五分 炙草 當歸 麥冬 黃柏各三分
五味子九粒 酒煨葛根 澤瀉 青皮各
二分 徐徐服

沈氏葳蕤湯

病後 葳蕤 茯苓 棗仁 石膏各一錢
人參七分 熱服 此余自製方也用之頗效
狐惑 大黃 黃連各二錢 黃芩一錢 共
三黃瀉心湯 作粗末以麻沸湯一盞浸之良久去渣分溫再
服

三黃瀉心湯

雄黃銳散

又 雄黃 青箱子 苦參 黃連各二錢
桃仁一錢 共為末以生艾汁和如棗核大絲
綿裹納下部如無生艾即以乾艾五錢煎濃汁
代之

黃連犀角湯

又 黃連 犀角 烏梅 木香 桃仁各一
錢 空心服

治惑桃仁湯

又 桃仁 生槐子碎 艾葉各二錢
熟病

四逆湯

治夢方五

別離散

總論 白朮一兩 天雄 肉桂 乾姜 茵

椴各五錢 茵芋葉 桑寄生各五錢 細辛

下 熟者去天雄 姜桂加知母 黃柏各三錢

當歸 生地各五錢 此方能治心風男夢

見女女夢見男用此去邪使不復見故曰別離

益氣安神湯

又 當歸 茯神各一錢 生地 麥冬 東

仁 遠志 人參 蜜黃芪 肥星 竹葉各

八分 甘草 黃連各四分 姜三 棗二

清心補血湯

又 人參一錢二分 當歸 白芍 茯神

棗仁 麥冬各一錢 川芎 生地 陳皮

山梔 炙甘草各五分 五味子十五粒

靜神丹

又 酒當歸 酒生地 姜遠志 茯神各五

錢 茵蒲 黃連各二錢半 辰砂二錢 犀

黃一錢 金箔十五片 猪心血丸黍米大金

箔為衣燈心湯下五十丸

雄朱散

鬼臚 牛黃 雄黃各一錢 硃砂五分每取

一錢床下燒之再取一錢酒調灌下

